

## Zelena prognoza za 14.6.2019. - O STANJU U USEVIMA ŠEĆERNE REPE

### FAZE ŠEĆERNE REPE

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI ŠEĆERNE REPE SE NALAZE U FAZI OD ZATVARANJA REDOVA DO FAZE RAZVIĆA KORENA.



SLIKA 1. USEV ŠEĆERNE REPE

### PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE (*Cercospora beticola*)

PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE JAVLJA SE SVAKE GODINE NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU I JEDAN JE OD EKONOMSKI NAJZNAČAJNIJIH PATOGENA ŠEĆERNE REPE.

PEGE SE PRVO JAVLJAJU NA STARIJEM LIŠĆU U VIDU OKRUGLASTIH, SITNIH, SIVIH PEGA OIVIČENIH MRKOM BOJOM. RAZVOJEM BOLESTI BROJ PEGA SE POVEĆAVA I DOLAZI DO SUŠENJA DELOVA ILI CELOG LISTA. POSLE UGINUĆA VEĆEG BROJA LISTOVA DOLAZI DO RETROVEGETACIJE, ŠTO SE NEGATIVNO ODRAŽAVA NA PRINOS KORENA I SADRŽAJ ŠEĆERA.

VIZUELNIM PREGLEDOM USEVA ŠEĆERE REPE REGISTROVANO JE PRISUSTVO PEGA OVOG PATOGENA. U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA I SORTIMENTA, PRISUSTVO PEGA JE REGISTROVANO NA DO 35% PREGLEDANIH BILJAKA.



SLIKA 2. SIMPTOM PROUZROKOVAČA PEGAVOSTI LIŠĆA ŠEĆERNE REPE

U PROIZVODNJI ŠEĆERNE REPE OD POLOVINE MAJA REGISTROVAN JE VELIKI BROJ POVOLJNIH USLOVA ZA OSTVARENJE INFEKCIJA OD OVOG PATOGENA. TRENUTNI NIVO PRISUSTVA SIMPTOMA POSLEDICA JE NEKOLIKO PRIMARNIH I PRVE SEKUNDARNE INFEKCIJE. S OBZIROM NA USLOVE KOJI SU VLADALI U PROIZVODNJI ŠEĆERNE REPE U PROTEKLIM PERIODU, U NAREDNIH NEKOLIKO DANA OČEKUJE SE NAGLO POVEĆANJE BROJA BILJAKA SA PEGAMA.



SLIKA 3. SIMPTOM PROUZROKOVAČA PEGAVOSTI LIŠČA ŠEČERNE REPE





SLIKA 4. SIMPTOM PROUZROKOVAČA PEGAVOSTI LIŠĆA ŠEĆERNE REPE

#### PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA ŠEĆERNE REPE SE PREPORUČUJU UČESTALI OBILASCI USEVA I PREGLED NA PRISUSTVO PEGA. UKOLIKO SE UTVRDI PRISUSTVO PEGA NA NIVOU ILI BLIZU EPIDEMIJSKOG PRAGA (50% BILJAKA SA BAR JEDNOM PEGOM), PREPORUČUJU SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE KOMBINACIJOM PREVENTIVNIH I SISTEMIČNIH FUNGICIDA:

PREPARATI	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
BRAVO 720 SC, DAKOFLO, BALEAR 720 SC	Hlorotalonil	1,5 l/ha
+	+	+
RIAS 300-EC, CERCOHEM	Difenokonazol+propikonazol	0,3 l/ha