

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O MERAMA ZAŠTITE USEVA SOJE OD GRINJA

.....

SOJA JE VEOMA ZNAČAJNA RATARSKA KULTURA NA NAŠEM PODRUČJU. NA TERITORIJI AP VOJVODINE GAJI SE NA PREKO 200 000 HEKTARA. TRENUTNO SE USEVI NALAZE U FAZI CVETANJA I FORMIRANJA I RAZVOJA MAHUNA, PRVE MAHUNE SU DOSTIGLE KRAJNJU VELIČINU.

NA USEVIMA SOJE, NAROČITO NA PARCELAMA KOJE SE NALAZE U BLIZINI VOĆNJAKA I ŠUMA, REGISTROVANO JE PRISUSTVO GRINJE-OBIČNOG PAUČINARA.

TO JE JEDNA OD NAJŠTETNIJIH GRINJA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI. HRANI SE KAKO NA GAJENIM TAKO I NA KOROVSIM BILJKAMA. OD POLJOPRIVREDNIH USEVA REDOVNO SE SREĆE NA PARADAJZU, PAPRICI, KRASTAVCIMA, LUBENICAMA, TIKVICAMA, SOJI, KUKURUZU, JABUKAMA I MNOGIM DRUGIM BILJKAMA.

OVE ŠTETOČINE ŽIVE NA NALIČJU LISTA GDE SE HRANE SISAJUĆI SOKOVE BILJAKA. KOD NAPADNUTIH BILJAKA POVEĆAVA SE TRANSPIRACIJA, SMANJUJE INTENZITET FOTOSINTEZE ŠTO ZA POSLEDICU IMA SKARAĆENJE VEGETACIJE, ZAOSTAJANJE U PORASTU I FORMIRANJE MANJIH MAHUNA SITNIJEG ZRNA.

RAZVOJU PAUČINARA POGODUJU SUŠNI USLOVI I POVIŠENE TEMPERATURE. PRI RELATIVNOJ VLAŽNOSTI OD 45 DO 55% I PRI TEMPERATURI OD 30°C RAZVOJ JEDNE GENERACIJE MOŽE DA TRAJE SVEGA 10 DANA TAKO DA ZA KRATKO VREME MOŽE DA DOĐE DO PRENAMNOŽENJA I VELIKIH ŠTETA NA USEVIMA.

VREMENSKI USLOVI KOJI SU NAJAVLJENI ZA NAREDNIH DESET DANA ĆE BITI VEOMA POVOLJNI ZA RAZVOJ GRINJA. SADA JE PRAVI MOMENAT DA SE USEVI SOJE PREGLEDAJU NA PRISUSTVO OVIH ŠTETOČINA. S OBZIROM DA SU OVE ŠTETOČINE VRLO SITNE, PAŽLJIVO TREBA PREGLEDATI NALIČJE LISTOVA. OVE GRINJE SU ŽUČKASTE BOJE S TIM ŠTO ŽENKE IMAJU DVE TAMNE MRLJE NA TELU. PAŽLJIVO TREBA PREGLEDATI RUBNE DELOVE PARCELA GDE SE GRINJE NAJPRE NASELJAVAJU. OVO JE PERIOD KADA PO POTVRDI PRISUSTVA GRINJA TREBA SPROVESTI MERE ZAŠTITE REGISTROVANIM AKARICIDIMA I TO PO OBODNIM DELOVIMA USEVA I NE DOZVOLITI NJIHOVU MIGRACIJU U UNUTRAŠNJOST PARCELE.

U USEVIMA SOJE SU REGISTROVANI SLEDEĆI AKARICIDI:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
VERTIMEC 018 EC	ABAMEKTIN	0,3-0,5 L/HA
ORTUS 5 SC	FENPIROKSIMAT	0,05-0,1%



SLIKA 1. USEV SOJE




SLIKA 2. USEV SOJE NAPADNUT GRINJAMA (PRETHODNE VEGETACIJE)



SLIKA 3. SIMPTOMI OŠTEĆENJA OD OBIČNOG PAUČINARA NA LISTOVIMA SOJE (PRETHODNE VEGETACIJE)



SLIKA 4. SIMPTOMI OŠTEĆENJA OD OBIČNOG PAUČINARA NA LISTOVIMA SOJE (PRETHODNE VEGETACIJE)



SLIKA 5. OBIČNI PAUČINAR NA NALIČJU LISTA SOJE



SLIKA 6. OBIČNI PAUČINAR NA NALIČJU LISTA

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM