

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U ZASADIMA LESKE

NA PODRUČJU VOJVODINE LESKA SE NALAZI U FAZI RAZVOJA PLODA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA LESKE

LEŠNIKOV SURLAŠ (*Curculio nucum*)

VIZUELNIM PREGLEDOM ZASADA LESKE UOČENO JE PRISUSTVO ODRASLIH JEDINKI LEŠNIKOVOG SURLAŠA. TO JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA U PROIZVODNJI LEŠNIKA U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA. ŠTETE NASTAJU OD ISHRANE IMAGA NA LIŠĆU I PLODOVIMA. NAKON DOPUNSKE ISHRANE ŽENKE BUŠE PLOD I U NJEGA POLAŽU JAJA. ISPILJENE LARVE HRANE SE JEZGROM PLODA I NAPADNUTI PLODOVI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.



SLIKA 2. IMAGO LEŠNIKOVOG SURLAŠA (IZVOR:WIKIPEDIA)



SLIKA 3. IMAGO LEŠNIKOVOG SURLAŠA (IZVOR:WIKIMEDIA)

PREPORUKA

U CILJU SUZBIJANJA IMAGA LEŠNIKOVOG SURLAŠA I SPREČAVANJA POLAGANJA JAJA, PREPORUČUJE SE TRETMAN INSEKTICIDOM:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
KARATE ZEON	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,2 L/HA

NESTABILNO VREME SA PADAVINAMA I OSETLJIVA FAZA LESKE, POGODUJU STVARANJU USLOVA ZA OSTVARENJE INEKCIJA PROUZROKOVAČA TRULEŽI PLODOVA LEŠNIKA. U CILJU ZAŠTITE MLADIH PLODOVA PREPORUČUJE SE PRIMENA FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
DIONAL 500 SC	IPRODION	1,5 L/HA

.....

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM