

O STANJU U ZASADIMA JABUKA

FAZE JABUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE JABUKE SE NALAZE U FAZI PORASTA PLODOVA, PLODOVI SU DOSTIGLI 40 I VIŠE MILIMETARA U PREČNIKU.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKE

ČAĐAVA KRSTAVOST JABUKE (*Venturia inaequalis*)

PEPELNICA JABUKE (*Podosphaera leucotricha*)

NA PODRUČJU VOJVODINE JOŠ UVEK TRAJE PERIOD PRIMARNIH ZARAZA OD PROUZROKOVAČA ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTOVA I KRSTAVOSTI PLODOVA JABUKE. IAKO SE U OPALOM LIŠĆU IZ PRETHODNE VEGETACIJE REGISTRUJE PRISUSTVO MALOG BROJA ASKOSPORA, SA NAREDNIM PADAVINAMA MOŽE SE OČEKIVATI NJIHOVO OSLOBAĐANJE I OSTVARENJE INFEKCIJA.

NA OSETLJIVIM SORTAMA JABUKA REGISTRUJE SE PRISUSTVO SIMPTOMA PEPELNICE. USLOVI SU VEOMA POVOLJNI ZA DALJI RAZVOJ I ŠIRENJE OVE GLJIVE.

PREPORUKA

U ZASADIMA JABUKA, ZA SUZBIJANJE OBA NAVEDENA PATOGENA, PRED NAJAVLJENE PADAVINE PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆE KOMBINACIJE FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA/DOZA
CAPTAN 50 WP	KAPTAN	0,3%
+	+	+
TOPAS 100-EC	PENKONAZOL	0,04%

JABUKIN SMOTAVAC (*Carpocapsa pomonella*)

U ZASADIMA JABUKA NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE PERIOD PILJENJA LARVI PRVE GENERACIJE JABUKINOG SMOTAVCA. NA PLODOVIMA SE REGISTRUJU JAJA PRED PILJENJE I TEK ISPILJENE LARVE. U ZAVISNOSTI OD REGIONA, NALAZIMO SE NA 50 DO 70% ISPILJENIH LARVI OVE ŠTETOČINE TE JE NEOPHODNO ZAŠTITITI PLODOVE OD UBUŠIVANJA LARVI.



SLIKA 2. JAJE PRED PILJENJE

PREPORUKA

ZA SUZBIJANJE LARVI JABUKINOG SMOTAVCA PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA/DOZA
IMIDAN 50-WP	FOSMET	0,15-0,2%