

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O CIKADI *Scaphoideus titanus* PRENOSIOCA FITOPLAZME KOJA PROUZROKUJE ZLATASTO ŽUTILO VINOVE LOZE I MERAMA ZA NJENO SUZBIJANJE

.....

TREKUTNO SE NALAZIMO SE U KLJUČNOM PERIODU ZA ZAŠTITU VINOVE LOZE OD VEOMA DESTRUKTIVNOG OBOLJENJA, ZLATASTOG ŽUTILA VINOVE LOZE. OVU BOLESTI PROUZOKUJE FITOPLAZMA KOJU PRENOSI CIKADA *Scaphoideus titanus*. NA ZARAŽENIM ČOKOTIMA DOLAZI DO PROMENE BOJE LISTA I POJAVE NEKROZE IZMEĐU GLAVNIH LISNIH NERAVA. U KASNIJIM FAZAMA LISTOVI SE SAVIJAJU PO OBODU PREMA NALIČJU. BOJA LISTOVA JE RAZLIČITA U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA VINOVE LOZE. KOD CRVENIH SORTI INFICIRANI LISTOVI SU TAMNOLJUBIČASTI DO SVETLOCRVENI, A KOD BELIH SORTI SVETLOŽUTI DO ZLATNOŽUTI. DUGOROČNO DOLAZI DO SUŠENJA I PROPADANJA ČOKOTA.

PREGLEDOM ZASADA VINOVE LOZE, NA NALIČJU LISTOVA, UOČENO JE PRISUSTVO LARVI CIKADE *Scaphoideus titanus* KOJE SU SPOSOBNE DA PRENESU FITOPLAZMU. SADA JE KLJUČNI MOMENAT ZA SPROVOĐENJE HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE SA CILJEM SUZBIJANJA CIKADE I SPREČAVANJA PRENOŠENJA BOLESTI. POSEBNU PAŽNJU TREBA DA OBRATE PROIZVOĐAČI VINOGRADA MALIH POVRŠINA, NA VIKENDICAMA I OKUĆNICAMA JER SU ONI, USLED NE REDOVNOG SPROVOĐENJA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE, IZVORI ZA DALJE ŠIRENJE ZARAZE.

## PREPORUKA

SA CILJEM SUZBIJANJA CIKADE *Scaphoideus titanus* PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:


PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
FURY 10 EC	ZETA-CIPERMETRIN	0,01-0,015%
SIVANTO PRIME	FLUPIRADIFURON	0,5 L/HA

PORED SUZBIJANJA CIKADE KAO PRENOSIOCA FITOPLAZME, MERE KONTROLE ZLATOSTOG ŽUTILA SU I STALNI SANITARNI PREGLEDI ZASADA, OBAVEZNO UKLANJANJE OBOLELIH ČOKOTA, UNIŠTAVANJE DIVLJE LOZE U OKRUŽENJU PROIZVODNIH ZASADA, UNIŠTAVANJE KOROVA I UNIŠTAVANJE I KRČENJE NAPUŠTENIH ZASADA VINOVE LOZE.

TAKOĐE, U OVOM MOMENTU TREBA NASTAVITI SA ZAŠTITOM VINOVE LOZE OD PATOGENA PROUZROKOVAČA PLAMENJAČE VINOVE LOZE, PEPELNICE VINOVE LOZE I SIVE TRULEŽI GROŽĐA. PREPORUČUJE SE PRIMENA KOMBINACIJE NEKIH OD REGISTROVANIH FUNGICIDA KONTAKTNOG I SISTEMIČNOG MEHANIZMA DELOVANJA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA VINOVE LOZE



SLIKA 2. LARVE CIKADE *Scaphoideus titanus*



SLIKA 3. LARVE CIKADE *Scaphoideus titanus* DRUGOG I TREĆEG RAZVOJNOG SUPNJA NA NALIČJU LISTA VINOVE LOZE



SLIKA 4. SIMPTOM ZLATASTOG ŽUTILA VINOVE LOZE



SLIKA 5. SIMPTOM ZLATASTOG ŽUTILA VONOVE LOZE

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O  
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU  
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)