

FAZE USEVA KROMPIRA

NA PODRUČJU VOJVODINE, USEVI KROMPIRA NAMENJENI ZA JESENJU PROIZVODNJU U FAZI SU TEHNOLOŠKE ZRELOSTI I PROPADANJA NADZEMNOG DELA CIME.



SLIKA1-FAZA RAZVOJA KROMPIRA

KROMPIROV MOLJAC (*Phthorimaea operculella*)

NA POSTAVLJENIM FEROMONSKIM KLOPKAMA BELEŽE SE I POJEDINAČNI PRIMERCIMA ODRASLIH JEDINKI KROMPIROVOG MOLJCA. NA KRAJU SMO TREĆE GENERACIJE. USKORO SE OČEKUJE POJAVA ČETVORTE GENERACIJE I POVEĆANJE BROJA LEPTIRA NA FEROMONSKIM KLOPKAMA.

REGISTRUJE SE PRISUSTVO LARVI TE JE NEOPHODNO NASTAVITI ZAŠTITU USEVA . BRIGA O USEVIMA KROMPIRA I DALJE PODRAZUMEVA VIŠE UDRUŽENIH MERA KONTROLE:

1. U USEVIMA U KOJIMA JE DOSTIGNUTA TEHNOLOŠKA ZRELOST, ODMAH VADITI KROMPIR I SKLADIŠTITI U PROSTORE SA ODGOVARAJUĆIM USLOVIMA I POSTAVLJENIM MREŽICAMA NA PROZORIMA
2. U USEVIMA KOJI NISU DOSTIGLI FAZU ZA VAĐENJE, KONTROLISATI STANJE BANKOVA I SPREČITI STVARANJE PUKOTINA KROZ KOJE LEPTIRI MOGU DOĆI DO KRTOLA I POLOŽITI JAJA
3. S OBZIROM DA JE U TOKU PILJENJE LARVI, U USEVIMA KOJI SE NE VADE, PRIMENITI HEMIJSKE MERE ZAŠTITE INSEKTICIDIMA LARVICIDNOG DELOVANJA NA BAZI LAMBDA CIHALOTRINA, PREPARAT GROM U DOZI 0,4L/HA



SLIKA2-ODRASLA JEDINKA KROMPIROVOG MOLJCA

KUPUSNI MOLJAC

FAZA RAZVOJA USEVA KUPUSA

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI KUPUSA ZA JESENJU PROIZVODNJU SU U FAZI 9 I VIŠE
RAZVIJENIH LISTOVA (BBCH 19)



SLIKA 3. FAZA RAZVOJA KUPUSA

KUPUSNI MOLJAC

VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA KUPUSA MOGU SE REGISTROVATI POLOŽENA JAJA I LARVE KUPUSNOG MOLJCA. U TOKU JE RAZVOJ VI GENERACIJE OVE ŠTETOČINE. U PRETHODNIM GODINAMA KUPUSNI MOLJAC JE USPEVAO, U NAŠIM USLOVIMA, DA RAZVIJE SEDAM I OSAM GENERACIJA GODIŠNJE.



SLIKA 4. LARVA KUPUSNOG MOLJCA



SLIKA 5. LARVA KUPUSNOG MOLJCA

PREPORUKA

OBAVEZAN PREGLED USEVA KUPUSA. UKOLIKO SE REGISTRUJE PRISUSTVO LARVI I JAJA KUPUSNOG MOLJCA SPROVESTI MERE KONTROLE PRIMENOM INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
SUMIALFA 5 EW	ESFENVALERAT	0,15 -0,20L/HA
MAVRIK EW	TAU-FLUVALINAT	0,3L/HA
LAMDEX	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,2-0,3L/HA