

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O ZAŠTITI PŠENICE OD PROUZROKOVAČA FUZARIOZE KLASA

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI PRŠENICE SE U ZAVISNOSTI OD VREMENA SETVE, LOKALITETA, SORTIMENTA I DO SADA PRIMENJENIH AGROTEHNIČKIH MERA NALAZE U RALIČITIM FAZAMA KLASANJA DO POČETKA CVETANJA.

U FAZAMA CVETANJA, PŠENICA JE OSTELJIVA NA INFEKCIJE KLASA GLJIVOM PROUZROKOVAČEM FUZARIOZE KLASA ILI ŠTUROSTI KLASA. OVO OBOLJENJE JE VEOMA ZNAČAJNO I JAVLJA SE SVAKE GODINE U PROIZVODNJI PŠENICE U RAZLIČITOM INTENZITETU. U USLOVIMA POVOLJNIM ZA RAZVOJ TOG PATOGENA, POSEBNO KOD OSETLJIVOG SORTIMENTA PRINOSI MOGU BITI UMANJENI DO 50%. PORED SAMNJENJA PRINOSA POSEBAN ZNAČAJ OVOG PATOGENA JE U NJEGOVOJ SPOSOBNOSTI DA NA OBOLELIM ZRNIMA SINTETIŠE MIKOTOKSINE KOJI SU VEOMA ŠTETNI PO ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTINJA.

PRVI SIMPTOMI OBOLJENJA UOČAVAJU SE ODMAH NAKON CVETANJA. ZARAŽENI KLASOVI POČINJU DA BLEDE, VRETENO IZUMIRE, A ZRNA IZNAD VRETENA OSTAJU ŠTURA. U USLOVIMA POVEĆANE VLAŽNOSTI, NA ZARAŽENIM KLASOVIMA SE JAVLJA RUŽIČASTA PREVLAKA OD SPORA TE GLJIVE.

PREPORUKA

DO INFEKCIJE PROUZROKOVAČEM FUZARIOZE KLASA DOLAZI SAMO U USLOVIMA VISOKE VLAŽNOSTI TAKO DA JE PREPORUKA DA SE PRATI I FAZA PŠENICE I VREMENSKE PROGNOZA. HEMIJSKE MERE ZAŠTITE SE PREPORUČUJU NA POČETKU CVETANJA, KADA 5% KLASOVA IZBACI PRAŠNIKE, PRE NAJAVLJENIH PADAVINA NEKIM OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJ	DOZA
PROSARO 250 EC	PROTIOKONAZOL+TEBUKONAZOL	0,75 – 1,0 L/HA
SANUS	TIOFANAT- METIL+DIFENOKONAZOL+CIFLUFENANID	1,5-2 L/HA
DUOFEN PLUS, SEKVENCA PLUS	TIOFANAT-METIL+DIFENOKONAZOL	1,5 L/HA
MYSTIC PRO 500 EC	PROHLORAZ+TEBUKONAZOL	1,25 L/HA
ZAMIR	PROHLORAZ + TEBUKONAZOL	0,75-1 L/HA
ELATUS ERA	PROTIOKONAZOL+BENZOVINDIFLUPIR	0,5-1 L/HA
POSTULAT DUO	PROTIOKONAZOL+TIOFANAT-METIL	1-1,25 L/HA
DELARO 325 SC	PROTIOKONAZOL+TRIFLOKSISTROBIN	1 L/HA
ANTRE PLUS	TEBUKONAZOL+TIOFANAT METIL	1,5 L/HA
CUSTODIA	TEBUKONAZOL+AZOKSISTROBIN	0,8 L/HA
ASCRA XPRO	BIKSAFEN+FLUOPIRAM+PROTIOKONAZOL	0,9-1,2 L/HA
CELLO	PROTIOKONAZOL+TEBUKONAZOL+SPIROKSAMIN	1,25 L/HA
FALCON FORTE	SPIROKSAMIN+TEBUKONAZOL+PROTIOKONAZOL	0,7- 1 L/HA

ILI NEKI DRUGI REGISTROVANI FUNGICID.

PREGLEDOM USEVA PŠENICE REGISTROVANO JE PRISUSTVO LARVI ŽITNE PIJAVICE. UKOLIKO SE REGISTRUJE PRISUSTVO OD 0,5 DO 1 LARVE TE ŠTETOČINE PO BILJCI, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
FASTAC 10 EC, FASCORD EC	ALFA-CIPERMETRIN	0,12 L/HA
DURBIN 200 EW	CIPERMETRIN	0,15-0,3 L/HA
CYTHRIN 250 EC	CIPERMETRIN	0,12-0,24 L/HA
POLUX, DECIS 2,5 EC, KONFUZIJA	DELTAMETRIN	0,2-0,3 L/HA
LAMBADA, LAMDEX, SAVATE CS 5, KARATE ZEON	LAMBDA- CIHALOTRIN	0,2-0,3 L/HA

ILI NEKI DRUGI REGISTROVANI INSEKTICID.



SLIKA 1. CVETANJE PŠENICE



SLIKA 2. SIMPTOM FUSARIOZE KLASA



SLIKA 3. SIMPTOM FUZARIOZR KLASA



SLIKA 4. BOLESNA I ZDRAVA ZRNA PŠENICE



SLIKA 5. LARVE ŽITNE PIJAVICE NA LISTU PŠENICE

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM