

O DUDOVCU

DUDOVAC (*Hyphantria cunea*)

DUDOVAC JE ŠTETOČINA VELIKOG BROJA VOĆNIH VRSTA NA NAŠEM PODRUČJU. ŠTETE PRIČINJAVAJU GUSENICE I U POJEDINIM GODINAMA MOŽE DA IZAZOVE GOLOBRST. HRANI SE NA PREKO 120 BILJNIH VRSTA, A NAJVEĆE ŠTETE PRIČINJAVA NA DUDU, ORAHU, JABUKAMA, ŠLJIVAMA, TREŠNJAMA, VIŠNJAMA, KAJSIJAMA, KRUŠKAMA, BRESKVAMA I RAZNOM UKRASNOM DRVEĆU I ŽBUNJU.

ODRASLE JEDINKE PRIPADAJU NOĆNIM LEPTIRIMA I BELE SU BOJE.



SLIKA 1. ODRASLE JEDINKE DUDOVCA

GUSENICE SU U POČETKU SVETLOZELENE BOJE, A KASNIJE POSTAJU ŠARENE I OBRASLE SU DUGAČKIM DLAKAMA. NA POČETKU RAZVOJA ŽIVE U GRUPAMA I SKELETIRAJU LIŠĆE.

KASNIJE SE RAZILAZE I KAO ODRASLE GUSENICE ŽIVE POJEDINAČNO, HRANE SE LIŠĆEM I MOGU SE NAĆI PO ČITAVOJ KRUNI.

GUSENICE PRAVE ZAPREDAK NA LISTOVIMA NA KOJIMA SE HRANE I NALAZE SE UNUTAR ZAPREDKA.

GUSENICE DRUGE GENERACIJE MOGU PRIČINJAVATI ŠTETE I NA PLODOVIMA VOĆA IZGRIZAJUĆI NJIHOVU POVRŠINU.



SLIKA 2. GUSENICE DUDOVCA MLAĐEG RAZVOJNOG STADIJUMA NA JABUCI



SLIKA 3. ŠTETE OD PRVE GENERACIJE DUDOVCA NA DUDU



SLIKA 4. ŠTETE OD PRVE GENERACIJE DUDOVCA NA ŠLJIVI

OVA ŠTETOČINA IMA DVE DO TRI GENERACIJE GODIŠNJE.
U TOKU JE LET LEPTIRA, POLAGANJE JAJA I PILJENJE GUSENICA DRUGE GENERACIJE.
VIZUELNIM PREGLEDIMA VOĆNIH ZASADA REGISTRUJE SE PRISUSTVO GUSENICA MLAĐIH
RAZVOJNIH STADIJUMA.



SLIKA 5. GUSENICE MLAĐEG RAZVOJNOG STADIJUMA NA JABUCI I ŠTETE USLED NJIHOVE ISHRANE (SKELETIRANO LIŠĆE)

PREPORUKA

U ZASADIMA I NA OKUĆNICAMA GDE SE REGISTRUJE PRISUSTVO GUSENICA DUDOVCA, PREPORUČUJE SE MEHANIČKO UKLANJANJE I UNIŠTAVANJE GUSENIČNIH ZAPREDAKA. HEMIJSKE MERE ZAŠTITE REGISTROVANIM INSEKTICIDIMA MOGUĆE SU SAMO KOD VOĆNIH VRSTA GDE JE BERBA ZAVRŠENA.