BILJNA VRSTA: SVE

ŠTETNI ORGANIZMI: **POLJSKI GLODARI**

PRE DESET DANA SMO VAS OBAVESTILI O OPASNOSTI OD POLJSKIH GLODARA ZBOG NJIHOVOG POVEĆANOG PRISUSTVA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI.

PRISUSTVO AKTIVNIH RUPA **POLJSKIH GLODARA**, DOMINANTNO POLJSKIH MIŠEVA, SE I DALJE REGISTRUJE U RAZLIČITIM KATEGORIJAMA BROJNOSTI U ZAVISNOSTI OD REGIONA, LOKALITETA, PREGLEDANOG STANIŠTA. NAJVEĆA BROJNOST (U III, IV I V KATEGORIJI) SE REGISTRUJE NA LUCERIŠTIMA (STARIM I MLADIM), PARCELAMA SA SAMONIKLOM ULJANOM REPICOM, STRNIŠTIMA, POVRĆU, ŠEĆERNOJ REPI, KUKURUZU, LEDINAMA, UTRINAMA, NASIPIMA I DRUGIM RUDERALNIM STANIŠTIMA. NA NOVOPOSEJANIM USEVIMA ULJANE REPICE I JEČMA, BROJNOSTI SE KREĆU OD I DO III KATEGORIJE.

KATEGORIJE ZA UTVRĐIVANJE BROJNOSTI POLJSKIH GLODARA:

KATEGORIJA	OPIS BROJNOSTI	BROJ RUPA PO HEKTARU	
		POLJSKA VOLUHARICA	POLJSKI MIŠ
I	VRLO NISKA	DO 10	DO 10
II	NISKA	10-500	10-50
III	SREDNJA	500-5000	50-500
IV	VISOKA	5000-20000	500-2000
V	VRLO VISOKA	20000-50000	2000-10000

POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE STALAN OBILAZAK I PREGLED USEVA RADI UTVRĐIVANJA PRAGA ŠTETNOSTI, NA OSNOVU KOG SE VRŠI PRIMENA RODENTICIDA. PRAG ŠTETNOSTI ZA POLJSKOG MIŠA IZNOSI 10-50 AKTIVNIH RUPA/HA.

MERE ZAŠTITE SE (PO UTVRĐIVANJU PRAGA ŠTETNOSTI) PREPORUČUJU U LUCERIŠTIMA, NOVOPOSEJANIM USEVIMA ULJANE REPICE I JEČMA, PARCELAMA GDE SE PLANIRA SETVA PŠENICE, KAO I U VOĆNIM ZASADIMA, PRIMENOM MAMAKA NA BAZI CINK-FOSFIDA U AKTIVNE RUPE:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
AGROCINKAN	CINK-FOSFID	5-10 G PO AKTIVNOJ RUPI
CINKOSAN		

SUZBIJANJE GLODARA PRIMENOM RODENTICIDA NA BAZI CINK-FOSFIDA JE VEĆ SPROVOĐENO U PROTEKLOJ NEDELJI I I DALJE TRAJE. MEĐUTIM, ONO ŠTO ZABRINJAVA JESTE DA SE NA PARCELAMA UOČAVA NESAVESNA PRIMENA MAMAKA, ODNOSNO RUPE NAKON APLIKACIJE NISU ZATPAVANE. TAKOĐE, UOČENI SU OSTAVLJENI MAMCI VAN RUPA NA POVRŠINI ZEMLJIŠTA. OVAKVA SITUACIJA NOSI SA SOBOM IZUZETNO VELIKI RIZIK OD TROVANJA SRNEĆE DIVLJAČI, FAZANA, ZEČEVA I PTICA.

JOŠ JEDNOM APELUJEMO PROIZVOĐAČIMA DA PRILIKOM APLIKACIJE MAMAKA DIREKTNO U AKTIVNE RUPE, ISTE OBAVEZNO ZATRPAJU KAKO BI SE IZBEGLI NAVEDENI RIZICI PO ZDRAVLJE LJUDI, ŽIVOTINJA I ŽIVOTNE SREDINE.

DETALJNIJE INFORMACIJE O ŠTETNIM ORGANIZMIMA I MERAMA NJIHOVE KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA PORTALU PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA AP VOJVODINE.

SLIKA 1. POLJSKI MIŠ NA LUCERIŠTU I AKTIVNE RUPE OD POLJSKIH GLODARA

SLIKA 2. RUPE OD GLODARA U USEVU ULJANE REPICE

SLIKA 3. RUPE OD POLJSKIH GLODARA U USEVU ŠEĆERNE REPE I ŠTETE NA KORENU

SLIKA 4. RUPE OD GLODARA U VOĆNJAKU

SLIKA 5. RUPE OD POLJSKIH GLODARA NA NEOBRAĐENIM POVRŠINAMA

SLIKA 6. NESAVESNA PRIMENA RODENTICIDA (NEZATRPAVANJE RUPA I RASIPANJE MAMAKA PO POVRŠINI ZEMLJIŠTA)