

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U USEVIMA PŠENICE

FENOFAZE RAZVOJA PŠENICE

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI PŠENICE IZ NAJRANIJIH ROKOVA SETVE SE NALAZE U FAZI DRUGOG KOLENCA. TEMPERATURE PROGNOZIRANE ZA OVU NEDELJU UTICAĆE NA ULAZAK OSTALIH USEVA PŠENICE U FAZU VLATANJA.

U VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA PŠENICE REGISTROVANO JE PRISUSTVO SIMPTOMA SLEDEĆIH BOLESTI:

- LISNE RĐE (*Puccinia triticina*)
- PEPELNICE ŽITA (*Erysiphe graminis*) I
- SIVE PEGAVOSTI LISTA PŠENICE (*Septoria tritici*)




SLIKA 1. SIMPTOM LISNE RĐE



SLIKA 2. SIMPTOM PEPELNICE ŽITA



SLIKA 3. SIMPTOM SIVE PEGAVOSTI LISTA PŠENICE



SLIKA 4. SIMPTOMI RĐE I SIVE PEGAVOSTI LISTA PŠENICE

U ZAVISNOSTI OD REGIONA, SORTIMENTA, UZRASTA PŠENICE, GUSTINE USEVA I DRUGIH FAKTORA, REGISTRUJE SE RAZLIČIT INTENZITET PRISUSTVA SIMPTOMA NAVEDENIH PATOGENA.

PROCENAT BILJAKA SA SIMPTOMIMA LISNE RĐE, PEPELNICE ŽITA I SIVE PEGAVOSTI LISTA PŠENICE PO REGIONIMA PRIKAZAN JE U TABELI:

Regionalni centar PIS-a	Procenat biljaka sa simptomima bolesti (%)		
	Lisna rđa	Pepelnica žita	Siva pegavost lista pšenice
Bačka Topola	0-17	9-83	6-50
Kikinda	0-5	4-14	0-10
Novi Sad	2-26	0-76	0-6
Pančevo	2-3	2	2-4
Ruma	1-27	17-52	13-22
Senta	0-18	5-100	0-32
Sombor	8-25	5-30	1-5
Sremska Mitrovica	7-12	40-45	18-28
Subotica	0	0-11	0-30
Vrbas	6-45	40-45	0-85
Vršac	0-5	5-57	0-5
Zrenjanin	0-2	8-21	1-2

PRISUSTVO BOLESTI REGISTRUJE SE U GOTOVO SVAKOM USEVU PŠENICE, A NA POJEDINIM PARCELAMA SU POSTIGNUTI EPIDEMIJSKI PRAGOV I ŠTETNOSTI. USPEŠNA ZAŠTITA PROTIV BOLESTI PŠENICE PODRAZUMEVA PRVENSTVENO ČUVANJE LISTA ZASTAVIČARA, ALI I DVA DO TRI LISTA ISPOD NJEGA KAKO BI SE FIZIOLOŠKI PROCESI U BILJCI NEOMETANO ODVIJALI.

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED USEVA U CILJU UTVRĐIVANJA PRISUSTVA SIMPTOMA BOLESTI I FAZE RAZVOJA USEVA. UKOLIKO SE PREGLEDOM PŠENICE UTVRDE SIMPTOMI BOLESTI NA PREKO 10% BILJAKA PO ULASKU U FAZU VLATANJA, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
DUETT ULTRA, CERES	EPOSIKONAZOL+TIOFANAT-METIL	0,4-0,6 L/HA
AMISTAR EXTRA	AZOKSISTROBIN+CIPROKONAZOL	0,5-0,75 L/HA
ANTRE PLUS	TEBUKONAZOL+TIOFANAT-METIL	1,5 L/HA
TEATAR PLUS	AZOKSISTROBIN+DIFENOKONAZOL	0,6-1 L/HA
OPERA MAX	PIRAKLOSTROBIN + EPOSIKONAZOL	1,2-2 L/HA
CUSTODIA	TEBUKONAZOL+AZOKSISTROBIN	0,8 L/HA
SEGURIS EXTRA	AZOKSISTROBIN+IZOPIRAZAM+CIPROKONAZOL	0,75-1 L/HA
SPHERE	TRIFLOKSISTROBIN+CIPROKONAZOL	0,5 L/HA

HEMIJSKE MERE ZAŠTITE TREBA SPROVESTI KADA TEMPERATURA VAZDUHA DOSTIGNE 15°C ZBOG EFIKASNIJEG DELOVANJA FUNGICIDA.

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM