

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAM SKREĆEMO PAŽNJU NA VAŽNOST PLODOREDA I ZNAČAJ NJEGOVOG POŠTOVANJA U PREDSTOJEĆOJ PROIZVODNJI ŠEĆERNE REPE I SUNCOKRETA

.....

PORAST TEMPERATURA VAZDUHA TOKOM OVE NEDELJE INICIRAO JE RADOVE U POLJU KOJI SE ODOSE NA PRIPREMU ZEMLJIŠTA ZA SETVU JARIH USEVA.

U PROIZVODNJI SVIH BILJNIH VRSTA VAŽNO JE POŠTOVATI SMENU USEVA, KAO OSNOVNOG PRAVILA DOBRE POLJOPRIVREDNE PRAKSE. POSLEDNIH GODINA, U NAŠIM BILJNIM PROIZVODNJAMA, PRISUTNO JE NEPRIDRŽAVANJE OVOG PRINCIPA, ŠTO DOVODI DO TRENUTNIH GUBITAKA PRINOSA, ALI I DUGOGODIŠNJIH POSLEDICA PO BILJNU PROIZVODNJU. UČESTALA SETVA I NEPOŠTOVANJE PLODOREDA, DOVODE DO PODIZANJA INFektivnog MATERIJALA ŠETNIH ORGANIZAMA U ZEMLJIŠTU, ŠTO OTEŽAVA KONTROLU NAD NJIMA. OVAJ NEGATIVNI EFEKAT NEPOŠTOVANJA PLODOREDA JE NAROČITO IZRAŽEN U PROIZVODNJI ŠEĆERNE REPE I SUNCOKRETA.

U PROIZVODNJI OVIH INDUSTRIJSKIH BILJAKA, U NAŠIM USLOVIMA SE SVAKE GODINE JAVLJAJU PATOGENI I ŠTETOČINE KOJI MOGU OGRANIČITI I PRINOS I KVALITET PROIZVODA, A KOJI SE DUGI NIZ GODINA ODRŽAVAJU U ZEMLJIŠTU.

U PROIZVODNJI ŠEĆERNE REPE TO SU GLJIVE PROUZROKOVAČI TRULEŽI KORENA I PROUZROKOVAČ PEGAVOSTI LIŠĆA REPE, ZATIM VIRUS NEKROTIČNOG ŽUTILA NERAVA REPE KOJI PROUZROKUJE RIZOMANIJU, A OD ŠTETOČINA SIVA REPINA PIPA, REPINA NEMATODA I DRUGI.

U PROIZVODNJI SUNCOKRETA TO SU PROUZROKOVAČ PLAMENJAČE SUNCOKRETA, PROUZROKOVAČ BELE TRULEŽI I MNOGE DRUGE GLJIVE PROUZROKOVAČI BOLESTI. SVI OVI ŠETNI ORGANIZMI TJ. NHJHOVI ORGANI ILI STADIJUMI RAZVOJA ZA PREZIMLJAVANJE, ZADRŽAVAJU VITALNOST U ZEMLJIŠTU DUŽI NIZ GODINA I U POVOLJNIM USLOVIMA SE AKTIVIRAJU I MOGU NANETI ZNAČAJNE GUBITKE TOKOM VEGETACIJE.

A USPEŠNA ZAŠTITA OD ŠETNIH ORGANIZAMA NIJE MOGUĆA SAMO PRIMENOM PESTICIDA. PRIMENA HEMIJSKIH MERA KONTROLE TREBA DA JE SAMO KRAJNJA ILI KOREKTIVNA MERA, A PRE TOGA BI TREBALO SPROVESTI SVE PREVENTIVNE MERE KOJE NAM STOJE NA RASPOLAGANJU. OD TIH PREVENTIVNIH MERA, KLJUČNA JE PRAVILNA PLODOSMENA USEVA TJ. PRAVILAN PLODORED.

PREPORUKA

S OBZIROM DA JE SETVA ŠEĆERNE REPE NA PRAGU, A POTOM I SUNCOKRETA, SADA JE VEOMA VAŽNO NAPRAVITI DOBAR ODABIR PARCELA I IZVRŠITI SETVU U NEZARAŽENA ZEMLJIŠTA. ZA SETVU OVIH KULTURA SE PREPORUČUJE **PETOPOLJNI PLODORED**. OVOM MEROM UTIČE SE KAKO NA SMANJENJE INFektivnog POTENCIJALA ŠETNIH ORGANIZAMA U OVOJ GODINI TAKO I NA OČUVANJE ZEMLJIŠNOG RESURSA ZA NAREDNI PERIOD.



SLIKA 1. SIMPTOMI TRULEŽ KORENA U USEVU ŠEĆERNE REPE



SLIKA 2. SIMPTOM TRULEŽI NA KORENU ŠEĆERNE REPE



SLIKA 3. SIMPTOM VENJENJA KAO POSLEDICA NAPADA REPINE NEMATODE



SLIKA 4. SIMPTOM NAPADA REPINE NEMATODE NA KORENU ŠEĆERNE REPE



SLIKA 5. SIMPTOM PLAMENJAČE SUNCOKRETA



SLIKA 6. SIMPTOM PLAMENJAČE SUNCOKRETA



SLIKA 7. SIMPTOM BELE TRULEŽI NA STABLU



SLIKA 8. SIMPTOMI BELE TRULEŽI NA STABLU BILJAKA SUNCOKRETA



SLIKA 9. SIMPTOM BELE TRULEŽI NA PRIZEMNOM DELU STABLA



SLIKA 10. SKLEROCIJE (PREZIMLJUJUĆI ORGANI) PROUZROKOVAČA BELE TRULEŽI

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O

POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM