

Zelena prognoza za 17.4.2018. - O stanju u usevima pšenice

FENOFAZE RAZVOJA PŠENICE

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI PŠENICE SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA VLATANJA, OD FAZE POČETAK RASTA STABLIKE DO FAZE DRUGO KOLENCE NAJMANJE 2CM IZNAD PRVOG.



SLIKA 1. USEV PŠENICE

U VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA PŠENICE REGISTROVANO JE PRISUSTVO SIMPTOMA SLEDEĆIH BOLESTI:

- SIVA PEGAVOST LISTA PŠENICE (*Septoria tritici*)

- RĐA PŠENICE (*Puccinia spp.*) I
- PEPELNICA ŽITA (*Erysiphae graminis*)

U ZAVISNOSTI OD REGIONA, SORTIMENTA, UZRASTA PŠENICE, GUSTINE USEVA I DRUGIH FAKTORA, REGISTRUJU SE RAZLIČITI PROCENTI ZARAŽENIH BILJAKA SA OVA TRI PATOGENA. NA POJEDINIM PARCELAMA UOČENO JE ŠIRENJE INFEKCIJE KA GORNJIM LISTOVIMA, A SIMPTOMI SE NALAZE I NA LISTOVIMA DRUGOG KOLENCA. NA TAKVIM USEVIMA POSTIGNUT JE PRAG ŠTETNOSTI.

USPEŠNA ZAŠTITA PROTIV BOLESTI PŠENICE PODRAZUMEVA PRVENSTVENO ČUVANJE LISTA ZASTAVIČARA, ALI I DVA DO TRI LISTA ISPOD NJEGA KAKO BI SE FIZIOLOŠKI PROCESI NEOMETANO ODVIJALI.



SLIKA 2. SIMPTOM SIVE PEGAVOSTI LISTA PŠENICE



SLIKA 3. SIMPTOM SIVE PEGAVOSTI LISTA PŠENICE



SLIKA 4. SIMPTOM RĎE I PEPELNICE NA PŠENICI



SLIKA 5. SIMPTOM PEPELNICE ŽITA NA LISTOVIMA PŠENICE

PREPORUKA

PROTIV PROUZROKOVAČA BOLESTI LISTA PŠENICE, U POVOLJNIM USLOVIMA ZA NJIHOV RAZVOJ, NEOPHODNO JE PRIMENITI HEMIJSKE MERE ZAŠTITE.

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED USEVA PŠENICE NA PRISUSTVO SIMPTOMA BILJNIH BOLESTI. UKOLIKO SE REGISTRUJE PRISUSTVO SIMPTOMA BOLESTI NA 10% BILJAKA NA LISTU DRUGOG KOLENCA, NEOPHODNO JE SPROVESTI HEMIJSKE MERE ZAŠTITE NEKIM OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
DUETT ULTRA	EPOKSIKONAZOL+TIOFANAT-METIL	0,4-0,6 L/HA
ACANTO PLUS	PIKOKSISTROBIN+CIPROKONAZOL	0,6 L/HA
AMISTAR EXTRA	AZOKSISTROBIN+CIPROKONAZOL	0,5-0,75 L/HA
ANTRE PLUS	TEBUKONAZOL+TIOFANAT-METIL	1,5 L/HA
PROSARO 250 EC	TEBUKONAZOL+PROTIOKONAZOL	0,75-1 L/HA
TEATAR PLUS	AZOKSISTROBIN+EPOKSIKONAZOL	0,6-1 L/HA