

## O STANJU U ZASADIMA JABUKA

### FENOFAZE JABUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE JABUKE SE NALAZE U FAZI RAZVOJA PLODOVA, PLODOVI SU DOSTIGLI DIMENZIJE DO 20 MILIMETARA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKE SORTE AJDARED

### **JABUKIN SMOTAVAC (*Carpocapsa pomonella*)**

JABUKIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA JABUKE. U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA DVE DO TRI GENERACIJE GODIŠNJE.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U PLODOVE I ISHRANJUJU MESOM PLODA I SEMENKAMA. NAPADNUTI PLODOVI PREVREMENO OTPADAJU I GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.

U SVIM REGIONIMA VOJVODINE U TOKU JE LET LEPTIRA PRVE GENERACIJE OVE ŠTETOČINE.

NA LISTOVIMA SE REGISTRUJU POLOŽENA JAJA RAZLIČITIH STADIJUMA RAZVOJA. PRISUTNA SU SVEŽE POLOŽENA-BELA JAJA, JAJA U RAZVOJU-SA CRVENIM OREOLOM I JAJA NEPOSREDNO PRED PILJENJE – JAJA SA CRNOM GLAVOM.

PRE NEDELJU DANA INFORMISALI SMO VAS O POČETKU PILJENJA LARVI U REGIONIMA NOVOG SADA I PANČEVA. TRENUTNO SE I U SVIM OSTALIM REGIONIMA REGISTRUJE PILJENJE LARVI PRVE GENERACIJE JABUKINOG SMOTAVACA.



SLIKA 2. SVEŽE POLOŽENO JAJE JABUKINOG SMOTVACA NA LISTU JABUKE



SLIKA 3. JAJE SA CRVENIM OREOLOM JABUKINOG SMOTVACA NA LISTU JABUKE

#### **PREPORUKA**

NA POČETKU PILJENJA LARVI U ZASADIMA JABUKA PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA OVICIDNO-LARVICIDNOG DELOVANJA:

<b>PREPARAT</b>	<b>AKTIVNA MATERIJA</b>	<b>KONCENTRACIJA</b>
RUNNER 240-SC	METOKSIFENOZID	0,04-0,06%

U ZASADIMA JABUKA NEOPHODNO JE NASTAVITI ZAŠTITU OD PROUZROKOVAČA ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTOVA I KRSTAVOSTI PLODOVA KAO I OD PROUZROKOVAČA PEPELNICE.

NEOPHODNO JE PRATITI USLOVE I PRED NAJAVLJENE PADAVINE PRIMENITI PREVENTIVNE  
MERE ZAŠTITE.