

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“  
DANAS VAS INFORMIŠEMO O AKTUELNIM MERAMA KONTROLE ŠTETNIH ORGANIZAMA U PROIZVODNJI RASADA POVRĆA

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE PROIZVODNJA RASADA PARADAJZA, KRSTAVACA, PAPRIKE, KUPUSNJAČA I DRUGOG POVRĆA.



SLIKA 1. RASAD PARADAJZA

U PROTEKLIM GODINAMA U PROIZVODNJI POVRĆA, KAKO U ZATVORENOM PROSTORU TAKO I NA OTVORENOM POLJU, VEOMA VELIKI PROBLEM PREDSTAVLJALO JE PRISUSTVO FITOPATOGENIH VIRUSA. U PROŠLOJ GODINI JE LABORATORIJSKI POTVRĐENO PRISUSTVO VIRUSA MOZAIKA KRSTAVCA, VIRUSA BRONZAVOSTI PARADAJZA I VIRUSA CRTIČASTOG MOZAIKA KROMPIRA. PRISUSTVO NAVEDENIH VIRUSA JE ZNAČAJNO UTICALO NA SMANJENJE KVALITETA PLODOVA ALI I NA SMANJENJE PRINOSA.



SLIKA 2. SIMPTOMI VIROZA NA POVRĆU





SLIKA 3. SIMPTOMI VIROZA NA POVRĆU



SLIKA 4. SIMPTOMI VIROZA NA POVRĆU

SADA JE KLJUČNO PREDUZETI SVE RASPOLOŽIVE MERE KONTROLE VIROZNIH OBOLJENJA U PROIZVODNJI RASADA JER UKOLIKO DOĐE DO IZNOŠENJA ZARAŽENOG RASADA NA OTVORENO POLJE, CELOKUPNA PROIZVODNJA POVRĆA MOŽE BITI UGROŽENA. TAKOĐE, TREBA IMATI U VIDU DA U KONTROLI VIROZA NE POSTOJI DIREKTNA MERA, NE POSTOJE PESTICIDI ZA SUZBIJANJE VIRUSA TE SU NAM NA RASPOLAGANJU SAMO PREVETIVNE MERE KONTROLE.

PREPORUČUJE SE SUZBIJANJE KOROVA U I OKO PLASTENIKA JER SE U KOROVIMA VIRUSI ODRŽAVAJU TOKOM ZIME I SLUŽE KAO STALNI IZVOR ZARAZA. TAKOĐE, VEOMA JE VAŽNO I REDOVNO PREGLEDATI RASAD SA CILJEM UTVRĐIVANJA PRISUSTVA VAŠI I TRIPSA KOJI SU PRENOSIOCI VIRUSA. VAŠI SE RAZVIJAJU NA NALIČJU LISTOVA TAKO DA IH UPRAVO TREBA TRAŽITI NA TIM BILJNIM DELOVIMA. TRIPSI SU VEOMA SITNI INSEKTI, MILIMETARSKIH VELIČINA, I NALAZE SE NA SVIM NADZEMNIM DELOVIMA BILJAKA. S OBZIROM NA NJIHOVU VELIČINU, NAJLAŠKI METOD ZA ODREĐIVANJE NJIHOVOG PRISUSTVA JE OTRESANJE BILJAKA NA BELU PODLOGU. TAKOĐE, ZA UTVRĐIVANJE PRISUSTVA VAŠI I TRIPSA MOGU SE



KORISTITI I ŽUTE LEPLJIVE KLOPKE KOJE SE POSTAVLJAJU U PLASTENIK. UKOLIKO SE REGISTRUJE PRISUSTVO VAŠI I TRIPSA PEREPORUČUJE SE SPROVOĐENJE HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE SA REGISTROVANIM INSEKTICIDIMA. UKOLIKO DO SADA NISU POSTAVLJENE ANTIINSEKATSKE MREŽE NA OTVORE, SADA IH TREBA POSTAVITI I NA TAJ NAČIN SPREČITI ULAZAK INSEKATA U OBJEKTE. AKO SE VIZUELNIM PREGLEDOM UOČI PRISUSTVO BILJAKA SA SIMPTOMIMA VIROZA TJ. BILJAKA SA CIGOVANIM NERVIMA ILI HLOTIČNIM MOZAIKOM NA LISTOVIMA, PREPORUČUJE SE NJIHOVO UKLANJANJE I UNIŠTAVANJE VAN PLASTENIKA.



SLIKA 5. TRIPSI NA NALIČJU LISTA PAPRIKE



SLIKA 6. VAŠI NA NALIČJU LISTA PAPRIKE I TRIPSI



SLIKA 7. VAŠI NA NALIČJU RASADA PAPRIKE I KRSTAVCA



SLIKA 8. KORIVI U PLASTENIKU



SLIKA 9. SIMPTOMI VIROZA NA MLADIM BILJKAMA PAPRIKE

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O  
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU  
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)