

## Zelena prognoza za 18.4.2018. - O stanju u usevima ječma

### FAZE RAZVOJA JEČMA

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI JEČMA SE NALAZE U FAZAMA POJAVE I RAZVOJA ZASTAVIČARA.



SLIKA 1. USEV JEČMA

### STANJE U USEVIMA JEČMA

PRE TRI NEDELJE INFORMISALI SMO VAS O PRISUSTVU SIMPTOMA RAZLIČITIH VRSTA BOLESTI LISTA U USEVIMA JEČMA (MREŽASTA PEGAVOST LISTA JEČMA, SOČIVASTA PEGAVOST LISTA JEČMA, RAMULARIOZNA PEGAVOST JEČMA I PEPELNICA ŽITA), O POSTIZANJU EPIDEMIJSKIH PRAGOVA I POTREBI SPROVEĐENJA MERA ZAŠTITE.

MONITORINGOM USEVA JEČMA NAKON SPROVEDENIH MERA KONTROLE, KOD POJEDINIH SORTI JEČMA REGISTRUJE SE DALJE ŠIRENJE SIMPTOMA RAMULARIOZNE PEGAVOSTI LISTA. U CILJU SPREČAVANJA INFEKCIJE KLASA I KASNIJEG PRENOŠENJA OVOG PATOGENA SEMENOM, SADA JE NEOPHODNO SPREČITI DALJU INFEKCIJU BILJAKA. U TU SVRHU SISTEM PROGNOZE PREPORUČUJE SPROVOĐENJE JOŠ JEDNOG HEMIJSKOG TRETMANA PO POSTIZANJU SLEDEĆEG PRAGA:

**10% BILJAKA SA SIMPTOMIMA RAMULARIOZNE PEGAVOSTI LISTA U FAZI KADA SE POJAVI LIST ZASTAVIČAR ALI JOŠ UVEK U RUKAVCU.**



SLIKA 2. SIMPTOMI RAMULARIOZNE PEGAVOSTI NA LISTOVIMA JEČMA



SLIKA 3. SIMPTOMI RAMULARIOZNE PEGAVOSTI NA LISTOVIMA JEČMA



SLIKA 4. SIMPTOMI RAMULARIOZNE PEGAVOSTI NA LISTOVIMA JEČMA

#### PREPORUKA

PO POSTIZANJU PRAGA ŠTETNOSTI PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
DUETT ULTRA	EPOSIKONAZOL+TIOFANAT-METIL	0,4 - 0,6 L/HA
OSIRIS	EPOSIKONAZOL+METKONAZOL	1,5 – 2,5 L/HA
PROSARO 250 EC	TEBUKONAZOL+PROTIKONAZOL	0,75 – 1 L/HA
KARIKA	HLOTALONIL+PROPIKONAZOL	2 L/HA