

Zelena prognoza za 18.7.2019. - O STANJU U ZASADIMA KRUŠAKA

FAZE RAZVOJA KRUŠAKA

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI KRUŠAKA SE, U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA, NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA PLODOVA. SREDNJESTASNE SORTE POPUT SANTA MARIJE I KARMEN SU U ZAVRŠNIM FAZAMA SAZREVANJA A KASNE SORTE POPUT VILJAMOVKE SE NALAZE U FAZI POJAVLJUJE SE BOJA KARAKTERISTIČNA ZA KULTIVAR. BERBA RANIH SORTI JE ZAVRŠENA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA KRUŠKE SORTE VILJAMOVKA

OBIČNA KRUŠKINA BUVA (*Cacopsylla pyri*)

OBIČNA KRUŠKINA BUVA JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA KRUŠKE U NAŠIM AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA. RAZVIJA VELIKI BROJ GENERACIJA TOKOM GODINE, ČAK DO 7, IMA VELIKU MOĆ REPRODUKCIJE I ZNAČAJAN DEO ŽIVOTA, SVIH PET STUPNJEVA RAZVOJA LARVI MOŽE DA PROVEDE U MEDNOJ ROSI ŠTO SVE OTEŽAVA NJENO SUZBIJANJE. TAKOĐE, ZNAČAJAN PROBLEM U KONTROLI OVE ŠTETOČINE PREDSTAVLJA I OGRANIČEN BROJ INSEKTICIDA KOJI JE REGISTROVAN ZA NJENO HEMIJSKO SUZBIJANJE KAO I NE SPROVOĐENJE ADEKVATNIH AGROTEHNIČKIH MERA KOJE BI DOPRINELE SMANJENJU NJENE POPULACIJE.

ŠTETE PROUZROKUJU SVIH PET LARVENIH STUPNJEVA, KOJI SE ISHRANJUJU SISAJUĆI SOKOVE BILJAKA. VIŠAK HRANE IZBACUJU U VIDU MEDNE ROSE KOJA JE IDEALNA PODLOGA

ZA RAZVOJ GLJIVA KOJE PROUZROKUJU ČAĐAVOST KAKO NA MLADARIMA TAKO I NA PLODOVIMA. PLODOVI SA ČAĐAVICOM GUBE KVALITET I SMANJENA IM JE TRŽIŠNA VREDNOST.



SLIKA 2. LIST KRUŠKE SA LARVAMA U MEDNOJ ROSI



SLIKA 3. PLOD KRUŠKE SA LARVAMA U MEDNOJ ROSI




SLIKA 4. ŠTETE NA MLADARIMA



SLIKA 5. ŠTETE NA PLODU

TRENUTNO SE U KRUŠICIMA REGISTRUJE PRISUSTVO SVIH RAZVOJNIH STADIJUMA OBIČNE KRUŠKINE BUVE. U TOKU JE PILJENJE LARVI ČETVRTE LETNJE GENERACIJE.



SLIKA 6. LARVE I JAJA OBIČNE KRUŠKINE BUVE NA NALIČJU LISTA KRUŠKE



SLIKA 7. IMAGO OBIČNE KRUŠKINE BUVE NA MLADARU KRUŠKE

PREPORUKA

U CILJU SUZBIJANJA LARVI PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
ABASTATE, KRAFT 1,8 EW, VERTIMEC 018 EC	ABAMEKTIN	0,15%

OBAVEZNO TREBA VODITI RAČUNA O KARENCI PRIMENJENIH PREPARATA KOJA ZA NAVEDENE INSEKTICIDE IZNOSI 14 DANA JER SE USKORO OČEKUJE BERBA SREDNJESTASNIH SORTI KRUŠAKA.

PREPORUKA JE DA SE TRETMAN SPROVEDE U VEČERNJIM ČASOVIMA A UZ INSEKTICID PREPORUČUJE SE I PRIMENA OKVAŠIVAČA KOJ IMA ULOGU RAZLAGANJA MEDNE ROSE I POJAČANJA INSEKTICIDNOG DELOVANJA.