

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O ZAŠTITI KUPUSNJAČA NAMENJENIH ZA JESENJU PROIZVODNJU

.....  
NA PODRUČJU VOJVODINE, U PROIZVODNJI KUPUSNJAČA, NAJZNAČAJNIJA JE PROIZVODNJA NAMENJENA ZA JESENJU BERBU I UPRAVO SE RASAĐIVANJE TIH KUPUSNJAČA PRIVODI KRAJU. RASAĐENE BILJKE SU U POČETNIM FAZAMA RAZVOJA LISTOVA.



SLIKA 1. RASAĐEN USEV KUPUSA

U PERIODU TOKOM I NEPOSREDNO NAKON RASAĐIVANJA, NA BILJKAMA KUPUSNJAČA SE REDOVNO SREĆU BUVAČI. TO SU SITNI INSEKTI, VELIČINE 2 DO 3 MILIMETRA, KOJI DOBRO SKAČU I LETE. MOGU BITI SJAJNOCRNI, TAMNOPLAVI I TAMNOZELENI ILI CRNI SA DVE UZDUŽNE ŽUTE PRUGE NA LEĐIMA. NA NAŠEM PODRUČJU POSTOJI NEKOLIKO VRSTA KOJE SE REDOVNO SREĆU NA KUPUSNJAČAMA, TO SU:

OBIČAN BUVAČ,  
CRNI BUVAČ,  
CRNONOGI BUVAČ,

VELIKI ŽUTOPRUGASTI BUVAČ,  
SREDNJI ŽUTOPRUGASTI BUVAČ I DRUGI.





SLIKA 2. BUVAČI NA LISTU KUPUSA



SLIKA 3. BUVAČI NA LISTU KUPUSA





SLIKA 4. BUVAČI NA LISTU KUPUSA



SLIKA 5. BUVAČ NA LISTU KUPUSA



SLIKA 6. BUVAČI NA LISTU KUPUSA

KOD SVIH NAVEDENIH BUVAČA ŠTETE PRIČINJAVAJU ODRASLE JEDINKE IZGRIZAJUĆI JAMIČASTO ILI RUPIČASTO KOTILEDONE I MLADO LIŠĆE. JAKO OŠTEĆENO LIŠĆE IMA SITAST IZGLLED. ZNAČAJ I ŠTETNOST BUVAČA SE POVEĆAVA U USLOVIMA SUVOG I TOPLOG VREMENA. USLED JAČEG NAPADA MOŽE DOĆI DO VENJENJA I POTPUNOG SUŠENJA BILJAKA.

KAKO SE NA RASAĐENIM BILJKAMA MOŽE UOČITI PRISUSTVO BUVAČA I KAKO JE U NAJAVI VEOMA TOPLO I SUVO VREME KOJE POGODUJE NJIHOVOJ AKTIVNOSTI, OBAVEZNO SE PREPORUČUJE PREGLED USEVA. HEMIJSKE MERE ZAŠTITE SE SPROVODE UKOLIKO JE OŠTEĆENO 10% LISNE MASE. U USEVIMA KUPUSA SU REGISTROVANI SLEDEĆI INSEKTICIDI:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
EXIREL	CIJANTRANILIPROL	0,5-0,75 L/HA
CIPKORD 20 EC, CIPRAZOR 20 EC, CRNA MAMBA	CIPERMETRIN	0,15-0,3 L/HA
SUMI ALFA 5 EW	ESFENVALERAT	0,15-0,2 L/HA
KOZAK, LAMBADA, LAMDEX	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,2-0,3 L/HA
GROM, HERBOS KING	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,3-0,4 L/HA
FASTAC 10 EC	ALFA-CIPERMETRIN	0,08-0,12 L/HA

PORED BUVAČA, NA MLADIM BILJKAMA SE MOGU JOŠ UOČITI I LARVE KUPUSOVOG MOLJCA I BELA KUPUSNA MUŠICA. SA NAVEDENIM INSEKTICIDIMA JE MOGUĆE SUZBIJANJE I TIH ŠTETOČINA, A ZBOG BOLJE POKRIVENOSTI LISNE POVRŠINE PREPORUČUJE SE I PRIMENA OKVAŠIVAČA.



TAKOĐE, ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA VAZDUHA, PREPORUČUJE SE SPROVOĐENJE TRETMANA U VEČERNJIM ČASOVIMA.



SLIKA 7. LARVA KUPUSOVOG MOLJCA I BELE KUPUSNE MUŠICE



SLIKA 8. BELA KUPUSNA MUŠICA

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE  
INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI  
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE  
[WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)