

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U ZASADIMA KRUŠAKA

FAZE RAZVOJA KRUŠAKA

NA PODRUČJU VOJVODINE KRUŠKE SE, U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA I LOKALITETA, NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA, OD FAZE POČETAK RAZVOJA LISTOVA DO FAZE RAZVIJENI CRVENI PUPOLJCI.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA KRUŠKE

OBIČNA KRUŠKINA BUVA (*Cacopsylla pyri*)

OBIČNA KRUŠKINA BUVA JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA KRUŠKE. ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SISAJU SOKOVE BILJAKA I PRILIKOM ISHRANE LUČE VELIKE KOLIČINE MEDNE ROSE. MEDNA ROSA KOJA SE NALAZI NA LASTARIMA, LISTOVIMA I PLODOVIMA OMOGUĆAVA NASELJAVANJE GLJIVE ČAĐAVICE. MICELIJA OVE GLJIVE NA LISTOVIMA SMANJUJE NJIHOVU ASIMILACIONU POVRŠINU, A ČAĐAVI PLODOVI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST. U REGIJAMA SA INTENZIVNOM PROIZVODNOM KRUŠAKA, OBIČNA KRUŠKINA BUVA JE NAJZNAČAJNIJI LIMITIRAJUĆI FAKTOR U PROIZVODNJI PLODOVA VISOKOG KVALITETA.



SLIKA 2. ŠTETE OD OBIČNE KRUŠKINE BUVE

VIZUELNIM PREGLEDIMA KRUŠAKA REGISTRUJE SE PRISUSTVO ISPILJENIH LARVI OBIČNE KRUŠKINE BUVE. KOD SORATA GDE JE DOŠLO DO POJAVE CVETNIH PUPOLJAKA LARVE SE NALAZE U OSNOVI LISNIH I CVETNIH DRŠKI I NA NALIČJU MLADIH LISTOVA. U TOKU JE PILJENJE LARVI PREZIMLUJUĆE GENERACIJE.



SLIKA 3. LARVA OBIČNE KRUŠKINE BUVE



SLIKA 4. JAJA I LARVE OBIČNE KRUŠKINE BUVE



SLIKA 5. LARVA U OSNOVI CVETNOG PUPOLJKA



SLIKA 6. LARVA OBIČNE KRUŠKINE BUVE

PREPORUKA

PREPORUČUJE SE PREGLED KRUŠAKA NA PRISUSTVO LARVI OBIČNE KRUŠKINE BUVE. UKOLIKO SE REGISTRUJE NJIHOVO PRISUSTVO, PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG PREPARATA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
VERTIMEC 018-EC, ABASTATE, KRAFT 1,8 EW, VERTIGO 1,8 EC	ABAMEKTIN	0,15%

UZ NEKI OD PRIKAZANIH PREPARATA PREPORUČUJE SE I PRIMENA MINERALNOG ULJA U ULOZI OKVAŠIVAČA U KONCENTRACIJI OD 0,3%.

U CILJU ZAŠTITE TEK FORMIRANE LISNE MASE OD PROUZROKOVAČA ČAĐAVE KRSTAVOSTI KRUŠKE PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE I PRIMENA FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
MANKOGAL 80, DITHANE M 45, BEVESAN 45 M	MANKOZEB	2,5 KG/HA

PRILIKOM PRIMENE HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE TREBA PREDUZETI SVE MERE U CILJU ZAŠTITE OPRAŠIVAČA.

POSEBNE MERE OPREZA TREBA PREDUZETI KOD RANOG SORTIMENTA, POPUT JUNSKE LEPTICE, GDE SE POČETAK CVETANJA OČEKUJE ZA 4 DO 7 DANA, U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA. U TAKVIM ZASADIMA MERE SUZBIJANJA OBIČNE KRUŠKINE BUVE TREBA PREDUZETI PRE POČETKA CVETANJA JER JE

PRIMENA INSEKTICIDA ZABRANJENA U FAZI CVETANJA!

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM