

## Zelena prognoza za 19.4.2018. - O sivoj repinoj pipi

### FAZE ŠEĆERNE REPE

NA PODRUČJU VOJVODINE VEĆINA USEVA ŠEĆERNE REPE SE NALAZI U FAZI OD KLICA PROBIJA POVRŠINU ZEMLJE DO FAZE POJAVE KOTILEDONA.



SLIKA 1. ŠEĆERNA REPA U FAZI KOTILEDONIH LISTOVA

### SIVA REPINA PIPA (*Bothynoderes punctiventris*)

U RANIM FAZAMA NICANJA I PORASTA, USEVI ŠEĆERNE REPE SU UGROŽENI OD SIVE REPINE PIPE. GLAVNE ŠTETE PRIČINJAVA IMAGO KOJI OŠTEĆUJE STABLJIKU, KOTILEDONE I STALNO LIŠĆE REPE. NAČIN NA KOJI ODRASLI INSEKTI OŠTEĆUJU BILJKE JE VEOMA KARAKTERISTIČAN. MLADE BILJČICE ŠEĆERNE REPE MOGU BITI POTPUNO PREGRIŽENE. NA LIŠĆU PIPA OTKIDA RUBOVE LIŠĆA PRAVEĆI POLUMESEČASTA VEĆA ILI MANJA UDUBLJENJA. SAMO U TOKU JEDNOG DANA JEDAN ODRASLI INSEKT MOŽE OŠTETITI 5 DO 15 BILJČICA STARIH JEDAN DAN. SA PORASTOM TEMPERATURE INTENZITET ISHRANE SE POVEĆAVA. UKOLIKO JE VREME SUVO I TOPLO, ZA NEKOLIKO DANA MOŽE DA UNIŠTI ČITAVE KOMPLEKSE POD REPOM.

**TRENTNO SE NA NOVIM REPIŠTIMA REGISTRUJE POVEĆANJE ULOVA REPINE PIPE. OVO JE KRITIČAN PERIOD U ZAŠTITI USEVA ŠEĆERNE REPE OD OVE ŠTETOČINE.**



SLIKA 2. REPINA PIPA NA FEROMONSKOJ KLOPCI



SLIKA 3. IMAGO REPINE PIPE



SLIKA 4. ISHRANA IMAGA REPINE PIPE

#### PREPORUKA

PAŽNJU TREBA USMERITI NA PREGLED USEVA ŠEĆERNE REPE I PRISUSTVO REPINE PIPE NA NJIMA. USEVE TREBA OBILAZITI U NAJTOPLIJEM DELU DANA KADA SU PIPE I NAJAKTIVNIJE. UKOLIKO SE REGISTRUJE 1-3 REPINE PIPE NA DESET METARA KVADRATNIH NEOPHODNO JE SPROVESTI HEMIJSKE MERE ZAŠTITE PRIMENOM REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
KONZUL, DESPOT, NURELLE-D	HLORPIRIFOS+CIPERMETRIN	1,5-2 L/HA
PYRINEX SUPER	HLORPIRIFOS+BIFENTRIN	1,5-2 L/HA