

Zelena prognoza za 19.4.2019. - O STANJU U USEVIMA JEČMA

FAZE RAZVOJA JEČMA

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI JEČMA SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA U ZAVISNOSTI OD DATUMA SETVE, LOKALITETA, SORTIMENTA I DO SADA SPROVEDENIH AGROTEHNIČKIH MERA. JEČMOVI KOJI SE GAJE U SUVOM RATARENJU SE NALAZE U FAZI DRUGOG KOLENCA, DOK SU USEVI JEČMA KOJI SE GAJE U USLOVIMA NAVODNJAVANJA U FAZI POJAVE LISTA ZASTAVIČARA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JEČMA

STANJE U USEVIMA JEČMA

VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA JEČMA REGISTROVANO JE PRISUSTVO SIMPTOMA RAZLIČITIH VRSTA PEGAVOSTI: MREŽASTA PEGAVOST LISTA JEČMA, SOČIVASTA PEGAVOST LISTA JEČMA, SIMPTOMI KOJI PODSEĆAJU NA RAMULARIOZNU PEGAVOST JEČMA, KAO I SIMPTOMI PEPELNICE ŽITA KOJI SU PRISUTNI NA PRVA TRI LISTA.



SLIKA 2. SIMPTOMI PEGAVOSTI NA LISTU



SLIKA 3. SIMPTOMI PEGAVOSTI NA LISTU



SLIKA 4. SIMPTOMI PEGAVOSTI NA LISTU

PREPORUKA

U USEVIMA JEČMA KOJI SU U FAZI ZASTAVIČARA, KAKO BI SE SAČUVAO PRINOS I SPREČILO DALJE ŠIRENJE PATOGENA, PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED NA PRISUSTVO SIMPTOMA BOLESTI. UKOLIKO SE REGISTRUJE 10% BILJAKA SA SIMPTOMIMA PEGAVOSTI PREPORUČUJE SE PRIMENA REGISTROVANIH FUNGICIDA.

TAKOĐE, U USEVIMA JEČMA U FAZI DRUGOG KOLENCA PREPORUČUJE SE PREGLED NA PRISUSTVO BOLESTI. UKOLIKO DO SADA NISU SPROVEDENE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE, A REGISTRUJE SE 10% BILJAKA SA SIMPTOMIMA PEGAVOSTI, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
ZANTARA	TEBUKONAZOL + BIKSAFEN	1 - 1,25 L/HA
OSIRIS	EPOSIKONAZOL + METKONAZOL	1,5 - 2,5 L/HA
ANTRE PLUS	TEBUKONAZOL + TIOFANAT-METIL	1,5 L/HA
DUETT ULTRA	EPOSIKONAZOL + TIOFANAT-METIL	0,4 - 0,6 L/HA
PROSARO 250 EC	TEBUKONAZOL + PROTIOKONAZOL	0,75 - 1 L/HA