

## O STANJU U ZASADIMA VINOVE LOZE

---

### FENOFAZE VINOVE LOZE

NA PODRUČJU VOJVODINE VINOVA LOZA SE NALAZI U FENOFAZAMA PRED CVETANJE, OD FAZE CVASTI JASNO VIDLJIVE DO FAZE CVASTI POTPUNO RAZVIJENE, CVETOVI ODVOJENI.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA SORTE FRANKOVKA

### PLAMENJAČA VINOVE LOZE (*Plasmopara viticola*)

PLAMENJAČA VINOVE LOZE JE VEOMA VAŽNO OBOLJENJE U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA I U GODINAMA POVOLJNIM ZA NJEN RAZVOJ MOŽE DA NANESE VELIKE ŠTETE U PROIZVODNJI GROŽĐA.

U VINOGORJIMA NA PODRUČJU VOJVODINE PRIBLIŽAVAMO SE KRAJU PRVE SEKUNDARNE INKUBACIJE OVOG PATOGENA.

USLOVI ZA RAZVOJ PLAMENJAČE VINOVE LOZE SU I DALJE POVOLJNI I UKOLIKO DOĐE DO INFEKCIJE CVETA, CEO PRINOS MOŽE BITI UGROŽEN.

### PREPORUKA

ZBOG POVOLJNOSTI USLOVA ZA RAZVOJ PLAMENJAČE I PRISUSTVA OSETLJIVE FENOFAZE VINOVE LOZE PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA/DOZA
MIKAL FLASH	FOSETIL-ALUMINIJUM+FOLPET	0,3-0,4%

### **PEPELNICA VINOVE LOZE (*Uncinula necator*)**

PEPELNICA VINOVE LOZE JAVLJA SE REDOVNO U NAŠIM VINOGRADARSKIM REGIJAMA. NAPADA SVE ZELJASTE DELOVE VINOVE LOZE, LIŠĆE, LASTARE, CVETOVE I GROZDOVE. U USLOVIMA POVOLJNIM ZA NJEN RAZVOJ MOŽE BITI VEOMA ŠTETNO OBOLJENJE I VODI KA SMANJENJU PRINOSA.

USLOVI KOJI TRENUTNO VLADAJU SU VEOMA POVOLJNI ZA RAZVOJ PEPELNICE. SUZBIJANJE OVOG PATOGENA U PERIODU CVETANJA JE VEOMA BITNO ZA OČUVANJE RODA.

### **PREPORUKA**

ZA SUZBIJANJE PEPELNICE VINOVE LOZE, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
KUMULUS DF, KOSSAN WG, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSE	SUMPOR	0,3-0,5%

### **PEPELJASTI GROŽĐANI MOLJAC (*Lobesia botrana*)**

PEPELJASTI GROŽĐANI MOLJAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA U PROIZVODNJI GROŽĐA U NAŠIM USLOVIMA. U ZAVISNOSTI OD REGIONA, RAZVIJA TRI DO ČETIRI GENERACIJE GODIŠNJE.

ŠTETNI STADIJUM SU LARVE KOJE NAKON PILJENJA UPREDAJU CVASTI VINOVE LOZE UNUTAR KOJIH SE HRANE. LARVE PRVE GENERACIJE HRANE SE CVETOVIMA, A LARVE KASNIJIH GENERACIJA OŠTEĆUJU BOBICE.

NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE PROCES PILJENJA LARVI PRVE GENERACIJE PEPELJASTOG GROŽĐANOG MOLJCA.



SLIKA 2. LARVA PEPELJASTOG GROŽĐANOG MOLJCA NA CVASTI VINOVE LOZE

#### PREPORUKA

U PERIODU INTENZIVNOG PILJENJA LARVI PEPELJASTOG GROŽĐANOG MOLJCA PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA SA LARVICIDNIM DELOVANJEM:

PREPARAT	AKTIVNAMATERIJA	DOZA
LAMDEX	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,07 L/HA