

Zelena prognoza za 19.6.2019. - O STRIČKOVOM ŠARENJAKU,  
NAJRASPROSTRANJENIJEM LEPTIRU NA SVETU KOJI MOŽE DA NANESE ŠTETE  
POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

**STRIČKOV ŠARENJAK (*Vanessa cardui*)**

STRIČKOV ŠARENJAK JE DNEVNI LEPTIR KOJI SE SVAKE GODINE JAVLJA NA NAŠEM PODRUČJU.  
TO JE MIGRATORNA VRSTA KOJA U NAŠE KRAJEVE DOLAZI IZ AFRIKE I SA MEDITERANA.



SLIKA 1. LEPTIR STRIČKOVOG ŠARENJAKA

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE HRANE LISNIM TKIVOM. U PRVOM DELU VEGETACIJE, LARVE SE MOGU VIDETI NA KOROVIMA KAO ŠTO SU PALAMIDA, ČIČAK I STRIČAK. SA KOROVA PRELAZI NA GAJENE USEVE, PRVENSTVENO NA SOJU, ALI I NA PASULJ, BORANIJU, GRAŠAK, SUNCOKRET, DUVAN I DRUGE BILJNE VRSTE. UKOLIKO DOĐE DO PRENAMNOŽENJA, USLED ISHRANE LARVI, MOŽE DOĆI DO GOLOBRSTA USEVA.

OD SREDINE PROŠLE NEDELJE REGISTRUJU SE IZUZETNO VISOKE BROJNOSTI LEPTIRA STRIČKOVOG ŠARENJAKA NA NAŠEM PODRUČJU.

VIZUELNIM PREGLEDIM USEVA SOJE, REGISTROVANO JE PRISUSTVO JAJA ŠTRIČKOVOG ŠARENJAKA NA DO 70% BILJAKA, DOK SE ISPIJENE LARVE NALAZE NA DO 12% BILJAKA. TAKOĐE, REGISTRUJU SE I OŠTEĆENJA NA LISTOVIMA USLED ISHRANE LARVI. U TOKU JE POLAGANJA JAJA I PILJENJE LARVI OVE ŠTETOČINE. U NAREDNIH NEKOLIKO DANA OČEKUJE SE MASOVNO PILJENJE LARVI.



SLIKA 2. JAJE ŠTRIČKOVOG ŠARENJAKA





SLIKA 3. LARVA ŠTRIČKOVOG ŠARENJAKA



SLIKA 4. IZGLED NAPADNUTOG USEVA SOJE

## **PREPORUKA**

KAKO TRENUTNA SITUACIJA UKAZUJE NA MOGUĆNOST POJAVE GOLOBRSTA NA POJEDINIM PARCELAMA SOJE, PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED USEVA NA PRISUSTVO LARVI STRIČKOVOG ŠARENJAKA. PORED LARVI OVE ŠTETOČINE, PREGLED TREBA IZVRŠITI I NA PRISUSTVO LARVI SOVICE GAMA I PAMUKOVE SOVICE. UKOLIKO SE REGISTRUJE BROJNOST LARVI KOJA UKAZUJE NA MOGUĆNOST GOLOBRSTA, PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA NA BAZI AKTIVNIH MATERIJA HLORPIRIFOS+CIPERMETRIN.

PORED HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE, VAŽNO JE I SUZBIJANJE KOROVSkih BILJAKA KOJE SU DOMAĆINI OVOJ ŠTETOČINI.