

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O AKTUELNIM MERAMA ZAŠTITE JABUKE I DUNJE OD PROUZROKOVAČA BAKTERIOZNE PLAMENJAČE JABUČASTOG VOĆA

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI JABUKA I DUNJA SE NALAZE U FAZAMA OD POČETKA DO PUNOG CVETANJA. U OVIM FAZAMA, JABUČASTO VOĆE JE NAJOSETLJIVIJE NA INFEKCIJU CVETOVA PROUZROKOVAČEM BAKTERIOZNE PLAMENJAČE JABUČASTOG VOĆA (*Erwinia amylovora*).

TO JE VEOMA DESTRUKTIVAN PATOGEN ČEMU U PRILOG GOVORI I ČINJENICA DA SE U NAŠOJ ZEMLJI NALAZI NA A2 LISTI KARANTINSKIH ŠTETNIH ORGANIZAMA. ZA KRATKO VREME MOŽE DA UNIŠTI VELIKI DEO BILJNE POVRŠINE PA ČAK I ČITAVE BILJKE. PRVI SIMPTOMI SE MOGU VIDETI NA MLADARIMA KOJI SU POVIJENI I IMAJU IZGLED PASTIRSKOG ŠTAPA. ZARAŽENI BILJNI DELOVI I LIŠĆE NA NJIMA SE SUŠI, DOBIJAJU MRKU BOJU I DELUJU KAO DA SU PLAMENOM SPALJENI PA OTUDA I NAZIV BOLESTI-BAKTERIOZNA PLAMENJAČA. U VLAŽNIM USLOVIMA, OVA BAKTERIJA SE VEOMA BRZO ŠIRI I ZA SAMO NEKOLIKO DANA SE U BILJNOM TKIVU MOŽE PROŠIRITI ZA 15 DO 30 CM. KOD MLADIH VOĆAKA MOŽE U JEDNOJ VEGETACIJI IZAZVATI POTPUNO SUŠENJE STABALA.

INFEKCIJA BAKTERIOZNOM PLAMENJAČOM OSTVARUJE SE PREKO TUČKA ILI RANA KOJE NASTAJU USLED VETRA I DRUGIH ABIOTIČKIH ČINILACA. OPTIMALNI USLOVI ZA OSTVARENJE INFEKCIJE I BRZU POJAVU BOLESTI SU TEMPERATURE OD 21 °C DO 27 °C, PRISUSTVO PADAVINA I VISOKA RELATIVNA VLAŽNOST VAZDUHA. MEĐUTIM, INFEKCIJE SU MOGUĆE I NA NIŽIM TEMPERATURAMA U VLAŽNIM USLOVIMA.

PREPORUKA

ZA PODRUČJE VOJVODINE SE OD PETKA NAJAVLJUJE PORAST TEMPERATURA I PROMENJIVO VREME SA PADAVINAMA, ČIME SE STVARA RIZIK OD ZARAŽENJA OVIM PATOGENOM.

KAKO JE SUZBIJANJE OVE BAKTERIJE IZUZETNO TEŠKO NAKON OSTVARENE INFEKCIJE, PRE PADAVINA SE PREPORUČUJE PREVENTIVNI TRETMAN NEKIM OD REGISTROVANIH PREPARATA:

ZA ZASADE JABUKA

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA/DOZA
FUNGURAN-OH, PATROL	BAKAR-HIDROKSID	0,05-0,06%
ERWIX	BACILUS SUPTILIS	10 L/HA
ALIETTE FLASH, FORTUNA, LEGAT SP	FOSETIL-ALUMINIJUM	0,4-0,45%
FOSCO	FOSETIL-ALUMINIJUM	0,3%

ZA ZASADE DUNJA

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA/DOZA
CUPRABLAU Z 35 WP	BAKAR-OKSIHLORID	0,85 KG/HA
EKSTRASOL F	BACILUS SUPTILIS	2 L/HA

PRIMENA INSEKTICIDA U FAZAMA CVETANJA VOĆA JE ZABRANJENA!



SLIKA 1. FAZA JABUKE



SLIKA 2. SIMPTOM BAKTERIOZNE PLAMENJAČE NA JABUCI



SLIKA 3. SIMPTOM BAKTERIOZNE PLAMENJAČE NA DUNJI



SLIKA 4. SIMPTOM BAKTERIOZNE PLAMENJAČE NA DUNJI



SLIKA 5. SIMPTOM BAKTERIOZNE PLAMENJAČE NA JABUCI



SLIKA 6. SIMPTOM BAKTERIOZNE PLAMENJAČE NA PLODU JABUKE



SLIKA 7. SIMPTOMI BAKTERIOZNE PLAMENJAČE NA JABUCI

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE
INFORMACIJE O POJAVI ŠETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM