

O stanju u usevima paprike

FAZE PAPRIKE

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI PAPRIKE IZ SEMENA NALAZE SE U FAZI RAZVIJENIH 9 I VIŠE LISTOVA, DOK SE USEVI PAPRIKE IZ RASADA NALAZE U FAZI POJAVE PRVIH CVASTI I POČETKA CVETANJA.



SLIKA1-FAZA RAZVOJA PAPRIKE IZ SEMENA



SLIKA2-FAZA RAZVOJA PAPRIKE IZ RASADA

LISNE VAŠI (*Aphididae*)

VIZUELNIM PREGLEDOM USEVA PAPRIKE REGISTROVANO JE PRISUSTVO LISNIH VAŠI. NA NALIČJU LISTOVA NALAZE SE KRILATE JEDINKE KAO I KOLONIJE VAŠI.



SLIKA3-LISNE VAŠI NA NALIČJU LISTA PAPRIKE

LISNE VAŠI PRIČINJAVAJU DIREKTNE I INDIREKTNE ŠTETE U USEVIMA PAPRIKE. DIREKTNE ŠTETE NASTAJU USLED ISHRANE, SISANJEM BILJNIH SOKOVA. IAKO DIREKTNE ŠTETE NISU ZANEMARLJIVE, MNOGO SU ZNAČAJNIJE INDIREKTNE ŠTETE KOJE SE OGLEDAJU U PRENOŠENJU BILJNIH VIRUSA.

PROŠLU GODINU OBELEŽILO JE PRISUSTVO NEKOLIKO BILJNIH VIRUSA U PROIZVODNJI PAPRIKE, A TAKOĐE REGISTROVANE SU I IZUZETNO VELIKE ŠTETE NA USEVIMA.

U LABORATORIJI SISTEMA PROGNOZE DETEKTOVANO JE U BILJKAMA PAPRIKE NEKOLIKO VEOMA DESTRUKTIVNIH BILJNIH VIRUSA:

- VIRUS MOZAIKA KRSTAVCA (Cucumber mosaic virus - CMV)
- VIRUSU MOZAIKA LUCERKE (Alfalfa mosaic virus – AMV)
- VIRUS BRONZAVOSTI PARADAJZA (Tomato spotted wilt virus – TSWV)



SLIKA4-SIMPTOMI VIRUSA MOZAIKA KRSTAVCA NA BILJKAMA PAPRIKE



SLIKA5-SIMPTOMI VIRUSA MOZAIKA KRSTAVCA NA PLODOVIMA PAPRIKE



SLIKA6-SIMPTOMI VIRUSA MOZAIKA LUCERKE NA LISTOVIMA PAPRIKE

VEKTORI VIRUSA MOZAIKA KRASTAVCA I VIRUSA MOZAIKA LUCERKA SU LISNE VAŠI. OVU SEZONU KARAKTERIŠE INTENZIVNO PRISUSTVO VAŠI U SKORO SVIM POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA. PORED VELIKOG BROJA GAJENIH KULTURA, DOMAĆINI OVIH BILJNIH VIRUSA SU I KOROVI KOJI PREDSTAVLJAJU REZERVOARE VIRUSA I IZVORE NOVIH ZARAZA.

PREPORUKA

S OBZIROM DA JE PROŠLU PROIZVODNU GODINU OBELEŽILO ZNAČAJNO PRISUSTVO VIRUSA U USEVIMA PAPRIKE, SADA KADA JE PAPRIKA NA PARCELAMA, VEOMA JE VAŽNO PRIDRŽAVATI SE OSNOVIH MERA KONTROLE A TO SU :

- UNIŠTAVANJE KOROVSKIH BILJAKA KAO REZERVOARA VIRUSA
- HEMIJSKO SUZBIJANJE VEKTORA-VAŠI

UKOLIKO SE U USEVIMA PAPRIKE REGISTRUJE PRISUSTVO VAŠI PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
CALYPSO 480-SC	TIAKLOPRID	0,15-0,2 L/HA

ACTARA 25 WG	TIAMETOKSAM	180 G/HA
SAVADOR 200 SL	IMIDAKLOPRID	0,2-0,3 L/HA
LANNATE 25 WP	METOMIL	1 KG/HA
TONUS	ACETAMIPRID	0,25-0,4 KG/HA