

O STANJU U ZASADIMA VINOVE LOZE

FENOFAZE VINOVE LOZE

NA PODRUČJU VOJVODINE VINOVA LOZA SE NALAZI U FAZI BOBICE VELIČINE ZRNA GRAŠKA, GROZDOVI OBEŠENI.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA VINOVE LOZE, SORTA ŠARDONE

PLAMENJAČA VINOVE LOZE (*Plasmopara viticola*)

U PRETHODNIM EMISIJAMA OBAVEŠTAVALI SMO VAS O POVOLJNIM USLOVIMA ZA RAZVOJ GLJIVE KOJA PROUZROKUJE PLAMENJAČU VINOVE LOZE, A PRE 12 DANA I O POJAVI SIMPTOMA OVOG PATOGENA U VINOGRADIMA GDE NISU SPROVEDENE ADEKVATNE MERE ZAŠTITE. OD TADA, REGISTRUJE SE POVEĆANJE SIMPTOMA NA LISTOVIMA VINOVE LOZE KOJI SU POSLEDICA SEKUNDARNIH INFEKCIJA PROUZROKOVAČEM PLAMENJAČE.

USLOVI ZA ŠIRENJE PLAMENJAČE VINOVE LOZE SU I DALJE POVOLJNI I UKOLIKO DOĐE DO INFEKCIJE GROZDA, CEO PRINOS MOŽE BITI UGROŽEN.



SLIKA 2. SIMPTOM PLAMENJAČE NA LISTU

PEPELNICA VINOVE LOZE (*Uncinula necator*)

PEPELNICA VINOVE LOZE JAVLJA SE REDOVNO U NAŠIM VINOGRADARSKIM REGIJAMA. NAPADA SVE ZELJASTE DELOVE VINOVE LOZE, LIŠĆE, LASTARE, CVETOVE I GROZDOVE. U USLOVIMA POVOLJNIM ZA NJEN RAZVOJ MOŽE BITI VEOMA ŠTETNO OBOLJENJE I VODI KA SMANJENJU PRINOSA.

NA OSETLJIVIM SORTAMA POPUT FRANKOVKE MOGU SE UOČITI SIMPTOMI PEPELNICE NA GROZDU U VIDU NAVLAKE OD SPORONOSNIH ORGANA GLJIVE.



SLIKA 3. SIMPTOM PEPELNICE NA GROZDU

PREPORUKA

ZBOG SITUACIJE U KOJOJ SE TRENUTNO NALAZIMO, A TO JE PRISUSTVO SIMPTOMA PLAMENJAČE I PEPELNICE U ZASADIMA, POVOLJNI USLOVI ZA DALJE ŠIRENJE OBA PATOGENA I OSETLJIVA FAZA VINOVE LOZE, NEOPHODNO JE IZVRŠITI HEMIJSKU ZAŠTITU VINOGRADA SA SLEDEĆOM KOMBINACIJOM FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
EQUATION PRO WG	CIMOKSANIL+FAMOKSADON	0,4 KG/HA
+	+	+
VIVANDO	METRAFENON	0,02%