

Zelena prognoza za 20.7.2018. - O stanju u zasadima jabuka

FAZE JABUKE

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI JABUKA SE NALAZE, U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA, U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA PLODOVA. LETNJE SORTE SU U FAZI BERBE, A OSTALE SORTE SU U FAZI OD PLODOVI DOSTIGLI 70 DO 80% KRAJNJE VELIČINE DO POČETKA ZRENJA, POJAVLJUJE SE KARAKTERISTIČNA BOJA ZA KULTIVAR.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKE

JABUKIN SMOTAVAC (*Carpocapsa pomonella*)

VIZUELNIM PREGLEDOM PLODOVA JABUKE REGISTROVANO JE PRISUSTVO JAJA JABUKINOG SMOTAVCA U RAZLIČITIM EBRIONALNIM FAZAMA RAZVOJA.

NA PODRUČJU VOJVODINE NALAZIMO SE NA 60 DO 90% ISPILJENIH LARVI DRUGE GENERACIJE JABUKINOG SMOTAVCA. NA REGIONIMA PANČEVO, NOVI SAD, RUMA I SENTA ZAPOČEO JE LET TREĆE GENERACIJE OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 2. JAJE JABUKINOG SMOTAVCA PRED PILJENJE NA PLODU



SLIKA 3. JAJE JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODU, FAZA CRVENI OREOL

PREPORUKA

OD POSLEDNJE PREPORUKE ODNOSNO OD VREMENA PRETHODNOG TRETMANA PROŠLO JE DOVOLJNO VREMENA DA NE MOŽEMO RAČUNATI NA DALJU EFIKASNOST INSEKTICIDA.

U CILJU ZAŠTITE PLODOVA JABUKE OD UBUŠIVANJA LARVI JABUKINOG SMOTAVCA PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
WARRANT POWER	IMIDAKLOPRID + GAMA-CIHALOTRIN	0,1 L/HA

KARENCA ZA NAVEDENI PREPARAT IZNOSI 14 DANA. U ZASADIMA GDE JE U TOKU BERBA NE PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA.