

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U USEVIMA ŠEĆERNE REPE

.....

FAZE ŠEĆERNE REPE

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI ŠEĆERNE REPE SE NALAZE U FAZI RAZVIĆA KORENA.




SLIKA 1. USEV ŠEĆERNE REPE

Pegavost lista šećerne repe (*Cercospora beticola*)

PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE SE JAVLJA SVAKE GODINE NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU I UTIČE NA PRINOS KORENA I SADRŽAJ ŠEĆERA.

SIMPTOMI OVOG PATOGENA JAVLJAJU SE NAJPRE NA STARIJEM LIŠĆU U VIDU SITNIH SIVIH PEGA KOJE SU OVIČENE MRKIM OREOLOM. U POVOLJNIM USLOVIMA ZA ŠIRENJE I RAZVOJ, BROJ PEGA NA LISTOVIMA SE POVEĆAVA I TKIVO UNUTAR PEGA NEKROTIRA I ISPADA, ŠTO DOVODI DO PROPADNJA DELOVA ILI CELOG LISTA, ODNOSNO DO SUŠENJA LISTOVA. USLED UNIŠTAVANJA LISNE MASE I POJAVE RETROVEGETACIJE DOLAZI DO ISCRPLJIVANJA BILJAKA I GUBITKA PRINOSA I SADRŽAJA ŠEĆERA.



SLIKA 2. SIMPTOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE



SLIKA 3. SIMPTOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE



SLIKA 4. SIMPTOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE

USLOVE U PROIZVODNJI ŠEĆERNE REPE U PROTEKLOM PERIODU KARAKTERISLE SU OBILNE I ČESTE PADAVINE. NA POJEDINIM LOKALITETIMA, U PROTEKLE DVE NEDELJE, REALIZIVANO JE I DO 100 MM PADAVINA. UZ PRISUSTVO PADAVINA REGISTROVANE SU I JAKE JUTARNJE ROSE I POVOLJNE TEMPERATURE ŠTO JE STVORILO VISOKE RIZIKE ZA OSTVARENJE INFEKCIJA OVIM PATOGENOM.

VIZUELNIM PREGLEDIMA BILJAKA ŠEĆERNE REPE REGISTRUJE SE POVEĆANJE BROJA PEGA U ODNOSU NA PROŠLE PREGLEDE KAKO NA STARIJEM TAKO I NA MLAĐEM LIŠĆU.

PREPORUKA

S OBZIROM DA JE OD PREDHODNE PREPORUKE ZA SUZBIJANJE PEGAVOSTI LISTA PROŠLO PETNAEST DANA VIŠE SE NE MOŽE RAČUNATI NA EFIKASNOST PRIMENJENIH FUNGICIDA. U CILJU ZAŠTITE OD PROUZROKOVAČA PEGAVOSTI LIŠĆA ŠEĆERNE REPE, NA PARCELAMA NA KOJIMA NEĆE POČETI VAĐENJE ŠEĆERNE REPE U PRVOJ POLOVINI SEPTEMBRA, PREPORUČUJU SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE NEKIM OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA	KARENCA
PROPULSE 250 SE	FLUOPIRAM+PROTIOKONAZOL	1-1,2 L/HA	14 DANA
BUMPER P	PROHLORAZ+PROPIKONAZOL	0,8-1 L/HA	21 DAN
ACANTO PLUS	PIKOKSISTROBIN+CIPROKONAZOL	0,6–0,8 L/HA	28 DANA

PRILIKOM PRIMENE HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE TREBA VODITI RAČUNA O KARENCI I MAKSIMALNOM BROJU TRETMANA PREPARATA U TOKU JEDNE VEGETACIJE.

.....
 POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM