

O STANJU U ZASADIMA JABUKA

FENOFAZE JABUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI JABUKA SE NALAZE U FAZI KRAJ CVETANJA, SVE LATICE OPALE.



SLIKA 1. FAZA JABUKE KRAJ CVETANJA

STANJE U ZASADIMA JABUKA

U SISTEMU PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE NA NEDELJNOM NIVOU PRATI SE DOZRELOST I ISPRAŽNJENOST PSEUDOTECIJA NAJZNAČAJNIJEG PATOGENA U PROIZVODNJI JABUKA - PROUZROKOVAČA ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRSTAVOSTI PLODOVA JABUKE (*Venturia inaequalis*). U PRIKAZANOJ TABELI MOGU SE VIDETI UTVRĐENI PROCENTI ZA PODRUČJE CELE VOJVODINE.

% DOZRELOSTI PSEUDOTECIJA	% ISPRAŽNJENOSTI PSEUDOTECIJA
25-57	4-9

REGISTROVANI PROCENTI DOZRELOSTI UKAZUJU NA VISOK NIVO INFektivNOG MATERIJALA KOJI JE U POVOLJNIM USLOVIMA SPREMAN DA OSTVARI INFEKCIJE.

PROCENTI ISPRAŽNJENOSTI UKAZUJU NA JOŠ UVEK VISOK NIVO PREOSTALIH PSEUDOTECIJA KOJE ĆE BITI SPREMNE ZA DALJA PRAŽNENJA SPORA I OSTVARENJE PRIMARNIH ZARAZA.



SLIKA 2. PSEUDOTECIJA *Venturia inaequalis* SA ZRELIM ASKOSPORAMA

OBILNE PADAVINE I DUGOTRAJNO VLAŽENJE LISTA U PROTEKLIM NEKOLIKO DANA STVORILI SU USLOVE ZA OSTVARENJE INFEKCIJA OD OVOG PATOGENA NA PODRUČJU CELE VOJVODINE. MEĐUTIM, SPROVOĐENJEM MERA ZAŠTITE PREMA PREPORUKAMA SISTEMA PROGNOZE OD PROŠLOG PETKA KADA SMO VAM PREPORUČILI PRIMENU KOMBINACIJE PREPARATA PREVENTIVNOG I SISTEMIČNOG DELOVANJA, MOŽE SE RAČUNATI NA USPEŠNU ZAŠTITU I SPREČAVANJE INFEKCIJA U PROTEKLOM PERIODU. ALI SA NAJAVOM PADAVINA ZA NEDELJU KOJE NOSE RIZIK OD NOVIH INFEKCIJA, NEOPHODNO JE PONOVO SPROVESTI MERE ZAŠTITE. U OVOM PERIODU VEOMA JE VAŽNO SPREČITI PRIMARNE INFEKCIJE I ZAŠTITITI TEK FORMIRANE PLODIĆE JABUKE.

PREPORUKA

PRED NAJAVLJENE PADAVINE NEOPHODNO JE SPROVESTI ZAŠTITU ZASADA JABUKA KOMBINACIJOM SLEDEĆIH PREPARATA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
MANKOGAL-80, CAIMAN, DITHANE DG NEOTEC	MANKOZEB	0,25%
+	+	+
CHORUS 50-WG, CIPRODEX	CIPRODINIL	0,05%