

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU
PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O OBIČNOJ KRUŠKINOJ BUVI

.....

FAZE RAZVOJA KRUŠAKA

NA PODRUČJU VOJVODINE KRUŠKE SE, U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA I SORTIMENTA,
NALAZE U FAZI OD PRECVETAVANJA DO FAZE POČETKA RAZVOJA PLODOVA.



SLIKA 1. ZASAD KRUŠKE



SLIKA 2. FAZA RAZVOJA KRUŠKE

OBIČNA KRUŠKINA BUVA (*Cacopsylla pyri*)

OBIČNA KRUŠKINA BUVA JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA KRUŠKE NA NAŠEM PODRUČJU. GLAVNI JE PROBLEM U INTENZIVNOJ PROIZVODNJI KRUŠAKA. ŠTETE NANOSE LARVE KOJE SISAJU SOKOVE BILJAKA, A VIŠAK HRANE IZLUČUJU U VIDU MEDNE ROSE NA KOJU SE NASELJAVA GLJIVA ČAĐAVICA. ČAĐAVI BILJNI DELOVI SMANJUJU ASIMILACIONU POVRŠINU ŠTO SE ODRAŽAVA NA SMANJENJE PRINOSA, A ČAĐAVI PLODOVI IMAJU MANJU TRŽIŠNU VREDNOST.



SLIKA 3. ŠTETE OD OBIČNE KRUŠKINE BUVE

STANJE U ZASADIMA KRUŠAKA

TRENUTNO JE U TOKU POČETAK RAZVOJA PRVE LETNJE GENERACIJE OBIČNE KRUŠKINE BUVE. VIZUELIM PREGLEDIMA ZASADA KRUŠAKA REGISTRUJE SE PRISUSTVO TEK EKLODIRANOG NESKELETIRANOG IMAGA. S OBZIROM NA PROGNOZIRANE TEMPERATURE, U NAREDNIM DANIMA SE OČEKUJE MASOVAN IZLAZAK IMAGA I POLNO SAZREVANJE JEDNOG DELA ODRASLIH JEDINKI KAO I POČETAK POLAGANJA JAJA.

U OVOM MOMENTU VEOMA JE VAŽNO SPREČITI DALJI RAZVOJ ODRASLIH JEDINKI, NJIHOVU KOPULACIJU I POLAGANJE JAJA.



SLIKA 4. NESKELETIRANI IMAGO OBIČNE KRUŠKINE BUVE



SLIKA 5. NESKELETIRANI IMAGO OBIČNE KRUŠKINE BUVE

PREPORUKA

U ZASADIMA KRUŠAKA, ZA SUZBIJANJE OBIČNE KRUŠKINE BUVE, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
DECIS 2,5 EC, FUTOCIS EC 2,5, KONFUZIJA	DELTAMETRIN	0,05%

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM