

Zelena prognoza za 21.5.2019. - O STANJU U ZASADIMA LESKE

FENOFAZE JABUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI LESKE SE NALAZE U FAZI FORMIRANJA PLODA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA LESKE

LEŠNIKOV SURLAŠ (*Curculio nucum*)

LEŠNIKOV SURLAŠ JE NAJZAČAJNIJA ŠTETOČINA LESKE NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU. U FAZAMA FORMIRANJA PLODA ŽENKE LEŠNIKOVOG SURLAŠA, NAKON

DOPUNSKE ISHRANE NA LIŠĆU, BUŠE PLOD I U NJEGA POLAŽU JAJA. NAKON PILJENJA, LARVE SE ISHRANJUJU JEZGROM PLODA KOJI GUBI TRŽIŠNU VREDNOST.



SLIKA 2. IMAGO LEŠNIKOVOG SURLAŠA

PREPORUKA

U CILJU SPREČAVANJA POLAGANJA JAJA U PLODOVE PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE INSEKTICIDOM:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
KARATE ZEON	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,2 L/HA

TRULEŽ PLODOVA LESKE (*Monilia fructigena*, *Sclerotinia coryle*)

VREME SA ČESTIM PADAVINAMA I VISOKOM VLAGOM VAZDUHA KOJE SE OVIH DANA REGISTRUJE NA NAŠEM PODRUČJU, STVARA POVOLJNE USLOVE ZA RAZVOJ PROUZROKOVAČA TRULEŽI PLODOVA LESKE. ZARAŽENI PLODOVI DOBIJAJU TAMNU BOJU, PREKIDAJU SA PORASTOM, SASUŠUJU SE I TEŠKO ISPADAJU IZ OMOTAČA.



SLIKA 3. TRULEŽ PLODOVA LESKE



SLIKA 4. TRULEŽ PLODOVA LESKE

PREPORUKA

U CILJU ZAŠTITE PLODOVA OD PROUZROKOVAČA TRULEŽI, PROIZVOĐAČIMA LESKE SE PREPORUČUJE PRIMENA FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
DIONAL 500 SC	IPRODION	1,5 L/HA