

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU
PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U USEVIMA BRESAKA I NEKTARINA

.....

FENOFAZE BRESKVE

NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE BERBA SREDNJESTASNIH SORATA BRESKVE I
NEKTARINE, DOK SE KASNOSTASNE SORTE NALAZE U FAZI OBOJAVANJA PLODA.




SLIKA 1. FAZA RAZVOJA NEKTARINE

BRESKVIN SMOTAVAC (*Cydia molesta*)

BRESKVIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA BRESAKA I NEKATRINA NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U VRHOVE LASTARA ILI U PLODOVE. NA MESTU UBUŠIVANJA LARVI U PLOD MOŽE SE VIDETI SMOLOTOČINA KOJA CURI IZ PLODA I TAKVI PLODOVI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST I OTPADAJU PRE VREMENA.



SLIKA 2. UBUŠENJE NA PLODU NEKTARINE OD LARVE BRESKVINOG SMOTAVCA

VIZUELNIM PREGLEDIMA REGISTRUJE SE PRISUSTVO PLOŽENIH JAJA BRESKVINOG SMOTAVCA. U TOKU JE POČETAK PILJENJA LARVI TREĆE GENERACIJE OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 3. JAJE BRESKVINOG SMOTAVCA NA NALIČJU LISTA BRESKVE

PREPORUKA

U CILJU SPREČAVANJA UBUŠIVANJA LARVI BRESKVINOG SMOTAVCA U PLODOVE PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA OVICIDNO-LARVICIDNOG DELOVANJA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA	KARENCA
CORAGEN 20 SC	HLORANTRANILIPROL	0,16 – 0,2 L/HA	14 DANA

PROUZROKOVAČI TRULEŽI PLODOVA (*Monilinia spp.*)

VIZUELNIM PREGLEDIMA BRESKVIKA REGISTRUJE SE PRISUSTVO SIMPTOMA TRULEŽI NA PLODOVIMA. USLOVI U KOJIMA SE ODVIJALA PROIZVODNJA U PROTEKLOM PERIODU SU BILI VEOMA POVOLJNI ZA RAZVOJ GLJIVA IZ RODA MONILINIA KOJE PROUZROKUJU RAZLIČITE VRSTE TRULEŽI.



SLIKA 4. SIMPTOM TRULEŽI NA PLODU



SLIKA 5. SIMPTOM TRULEŽI NA PLODU

PREPORUKA

U FAZAMA SAZREVANJA PLODOVA, U CILJU ZAŠTITE ZASADA OD PROUZOKOVAČA TRULEŽI, PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PRIMENA NEKOG OD FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA	KARENCA
GEOXE 50 WG	FLUDIOKSONIL	0,4-0,45 KG/HA	3 DANA
AKORD	TEBUKONAZOL	0,5 L/HA	7 DANA
EMBRELIA 140 SC	IZOPIRAZAM+DIFENOKONAZOL	0,1%	7 DANA
SIGNUM	BOSKALID+PIRAKLOSTROBIN	0,562-0,75 KG/HA	7 DANA
SWITCH 62,5 WG	CIPRODINIL+FLUDIOKSONIL	0,8 – 1 KG/HA	14 DANA

PRILIKOM PRIMENE PESTICIDA OBAVEZNO TREBA VODITI RAČUNA O KARENCI PRIMENJENIH PREPARATA.

AZIJSKA VOĆNA MUŠICA (*Drosophila suzukii*)

NA PODRUČJU VOJVODINE, U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA U FRUŠKOGORSKOJ REGIJI I U REGIONU SUBOTICE, REGISTROVANI SU PRVI ULOVI ODRASLIH JEDINKI AZIJSKE VOĆNE MUŠICE NA KLOPKAMA SA MIRISNIM ATRAKTANTIMA.

OVA ŠTETOČINA NAPADA PLODOVE KOŠTIČAVOG I JAGODIČASTOG VOĆA U PERIODU SAZREVANJA PLODOVA. ŽENKE POLAŽU JAJA U PLODOVE, UNUTAR KOJIH SE RAZVIJAJU LARVE. NAPADNUTI CRVLJIVI PLODOVI SU PODLOŽNI NAPADU RAZLIČITIH PROUZROKOVAČA TRULEŽI.



SLIKA 6. ODRASLE JEDINKE AZIJSKE VOĆNE MUŠICE, MUŽJAK (NA SLICI DOLE) I ŽENKA (NA SLICI GORE)



SLIKA 7. KLOPKA SA MIRISNIM ATRAKTANTOM ZA ULOV AZISIJE VOĆNE MUŠICE U ZASADU BRESKVE

S OBZIROM NA VEOMA VISOK REPRODUKTIVNI POTENCIJAL OVE ŠTETOČINE PROIZVOĐAČIMA SE, U FAZAMA SAZREVANJA PLODOVA, PREPORUČUJE SPROVOĐENJE SVIH RASPOLOŽIVIH MERA KONTROLE KOJE PODRAZUMEVAJU:

- POSTAVLJANJE VELIKOG BROJA KLOPKI ZA MASOVNO IZLOVLJAVANJE U CILJU SMANJENJA BROJA ODRASLIH JEDINKI
- UNIŠTAVANJE PREZRELIH PLODOVA KOJI PREDSTAVLJAJU IDEALNU PODLOGU ZA RAZVOJ OVE ŠTETOČINE
- SKRAĆIVANJE INTERVALA BERBE RADI ŠTO BRŽEG SKLANJANJA ZRELIH PLODOVA SA PARCELE
- UKLANJANJE DIVLJE KUPINE, ZOVE, DŽANARIKE I DRUGIH BILJNIH VRSTA KOJE MOGU BITI DOMAĆINI OVOJ ŠTETOČINI SA IVICA PARCELA
- KRČENJE NAPUŠTENIH ZASADA KOJI PREDSTAVLJAJU IDEALNO MESTO ZA NEOMETANO UMNOŽAVANJE OVE VEOMA OPASNE ŠTETOČINE

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM