

## **O KUPUSOVOM MOLJCU I MERAMA ZAŠTITE KOJE JE NEOPHODNO PRIMENITI U CILJU SUZBIJANJA OVE ŠTETOČINE**

### **FAZE KUPUSA**

USEVI LETNJEG KUPUSA NALAZE SE U FAZI OD RAZVOJA GLAVICE DO GLAVICE SPREMNE ZA BERBU. USEVI KUPUSA NAMENJENI ZA JESENJU PROIZVODNJU NALAZE SE U FAZI OD DEVET I VIŠE LISTOVA RAZVIJENO DO POČETKA FORMIRANJA GLAVICE.

### **KUPUSOV MOLJAC (*Plutella maculipennis*)**

KUPUSOV MOLJAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA KUPUSNJAČA NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU.

ŠTETE ČINE GUSENICE HRANEĆI SE LISTOVIMA, A PRI JAČEM NAPADU DOLAZI DO GOLOBRSTA KADA OSTAJU SAMO GLAVNI NERVI NA LISTOVIMA.

TOKOM JEDNE GODINE U NAŠIM USLOVIMA OVA ŠTETOČINA RAZVIJA SEDAM DO OSAM GENERACIJA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA KUPUSNJAČA REGISTRUJE SE PRISUSTVO GUSENICA NA NALIČJU LISTOVA. U TOKU JE PILJENJE GUSENICA SEDME GENERACIJE KUPUSOVOG MOLJCA.



SLIKA 1. GUSENICA KUPUSOVOG MOLJCA



SLIKA 2. GUSENICA KUPUSOVOG MOLJCA

### PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA KUPUSNJAČA PREPORUČUJE SE PREGLED BILJAKA NA PRISUSTVO GUSENICA KUPUSOVOG MOLJCA. UKOLIKO SE REGISTRUJE NJIHOVO PRISUSTVO PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJ	DOZA	KARENCA
SUMI ALPHA 5 EW	ESFENVALERAT	0,15-0,2 L/HA	28 DANA
KOZAK	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,2 L/HA	14 DANA
ALVERDE	METAFLUMIZON	1 L/HA	7 DANA

PODSEĆAMO PROIZVOĐAČE DA JE OBAVEZNO POŠTOVANJE KARENCE PRIMENJENIH INSEKTICIDA, A U USEVIMA KOJI SU U FAZI BERBE NE PRIMENJIVATI HEMIJSKE MERE ZAŠTITE!