

O STANJU USEVA ŠEĆERNE REPE NA PODRUČJU VOJVODINE

USEVI ŠEĆERNE REPE

SETVA ŠEĆERNE REPE U VOJVODINI JE U TOKU. U NAREDNIM DANIMA MOŽE SE OČEKIVATI NICANJE BILJAKA NA PARCELAMA IZ RANIH ROKOVA SETVE.

U RANIM FAZAMA NICANJA I PORASTA, USEVI ŠEĆERNE REPE SU UGROŽENI OD SIVE REPINE PIPE.

U OKVIRU SISTEMA PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE PRATI SE KRETANJE REPINE PIPE NA STARIM I NOVIM REPIŠTIMA POMOĆU FEROMONSKIH KLOPKI. **NA STARIM REPIŠTIMA REGISTRUJU SE PRVI ULOVI REPINE PIPE.**

SIVA REPINA PIPA (*Bothynoderes punctiventris*)

SIVA REPINA PIPA JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA ŠEĆERNE REPE. GLAVNE ŠTETE PRIČINJAVA IMAGO KOJI OŠTEĆUJE STABLJIKU, KOTILEDONE I STALNO LIŠĆE REPE.

MLADE BILJČICE ŠEĆERNE REPE MOGU BITI POTPUNO PREGRIŽENE. NA LIŠĆU PIPA OTKIDA RUBOVE LIŠĆA PRAVEĆI POLUMESEČASTA VEĆA ILI MANJA UDUBLJENJA. SAMO U TOKU JEDNOG DANA JEDAN ODRASLI INSEKT MOŽE OŠTETITI 5 DO 15 BILJČICA STARIH JEDAN DAN. SA PORASTOM TEMPERATURE INTENZITET ISHRANE SE POVEĆAVA. U POČETKU PRVO STRADAJU IVIČNI DELOVI PARCELE, POGOTOVO AKO SE NALAZE BLIZU STAROG REPIŠTA. KADA POČNE LET INSEKATA ŠTETE SE JAVLJAJU NA CELOJ PARCELI U VIDU MANJIH ILI VEĆIH OAZA. UKOLIKO JE VREME SUVO I TOPLO, ZA NEKOLIKO DANA MOŽE DA UNIŠTI ČITAVE KOMPLEKSE POD REPOM.

KRITIČAN PERIOD PREDSTAVLJA VREME OD KLIJANJA I NICANJA REPE DO OBRAZOVANJA PRVOG PARA STALNIH LISTOVA. ISHRANA BILJKAMA ŠEĆERNE REPE NEOPHODNA JE RADI POLNOG SAZREVANJA I KOPULACIJE REPINE PIPE.



SLIKA 1. IMAGO SIVE REPINE PIPE



SLIKA 2. IMAGO SIVE REPINE PIPE

PROGNOZIRANI PORAST TEMPERATURA ZA NAREDNI PERIOD DOPRINEĆE UBRZANOM IZLASKU OVE ŠTETOČINE SA MESTA PREZIMLJAVANJA. TAKOĐE, SKRATIĆE SE VREME OD IZLASKA DO POLETANJA REPINE PIPE. NA TEMPERATURAMA PREKO 20 °C PIPA POČINJE DA LETI NA NOVOPOSEJANE USEVE ŠEĆERNE REPE.

DOLAZI VEOMA KRITIČAN PERIOD S OBZIROM DA REPINA PIPA MOŽE U VRLO KRATKOM PERIODU UNIŠTITI ZNAČAJNE POVRŠINE SA TEK IZNIKIM MLADIM BILJČICAMA ŠEĆERNE REPE.

USLOVI U KOJIMA SE NALAZIMO ZAHTEVAJU DODATNU PAŽNJU PROIZVOĐAČA. IZLAZAK REPINE PIPE, NJENO POLETANJE I POTRAGA ZA HRANOM POKLOPIĆE SE SA FAZAMA NICANJA BILJAKA ŠEĆERNE REPE.

PREPORUKA

ZA SADA SE NE PREPORUČUJU HEMIJSKE MERE ZAŠTITE, ALI JE NEOPHODNO STALNO POSMATRANJE STARIH REPIŠTA I IZLAZAK PIPE. TAKOĐE SE PAŽNJA MORA USMERITI I NA PRAĆENJE NICANJA NOVIH REPIŠTA.