

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U USEVIMA JEČMA

.....

FAZE RAZVOJA JEČMA

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI JEČMA SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA U ZAVISNOSTI OD DATUMA SETVE, LOKALITETA, SORTIMENTA I DO SADA SPROVEDENIH AGROTEHNIČKIH MERA. TRENUTNO SE NA NAJVEĆEM BROJU PARCELA JEČAM NALAZI U FAZI ZASTAVIČARA.

STANJE U USEVIMA JEČMA

VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA JEČMA REGISTROVANO JE PRISUSTVO SIMPTOMA RAZLIČITIH VRSTA PEGAVOSTI (MREŽASTA PEGAVOST LISTA JEČMA, SOČIVASTA PEGAVOST LISTA JEČMA, SIMPTOMI KOJI PODSEĆAJU NA RAMULARIOZNU PEGAVOST JEČMA), KAO I SIMPTOMI PEPELNICE ŽITA.



SLIKA 1. SIMPTOMI PEGAVOSTI NA LISTU



SLIKA 2. SIMPTOMI PEGAVOSTI NA LISTU



SLIKA 3. SIMPTOMI PEGAVOSTI NA LISTU



SLIKA 4. SIMPTOMI PEGAVOSTI NA LISTU

PREPORUKA

PRE NEDELJU DANA SMO VAS INFORMISALI O POTREBI SPROVOĐENJA MERA ZAŠTITE U USEVIMA JEČMA IZ NAJRANIJIH ROKOVA SETVE KOJI SU TADA BILI U FAZI POJAVE ZASTAVIČARA. TRENUTNO SE I USEVI IZ OSTALIH ROKOVA SETVE NALAZE U FAZI POJAVE ZASTAVIČARA I OVO JE VEOMA VAŽAN MOMENAT SA ASPEKTA OČUVANJA ZDRAVSTVENOG STANJA USEVA I POSTIZANJA STABILNIH PRINOSA.

U POSLEDNJIH NEKO LIKO GODINA REGISTRUJU SE ZNAČAJNE ŠTETE U USEVIMA JEČMA OD PROUZROKOVAČA RAMULARIOZNE PEGAVOSTI. OVO JE PATOGEN ČIJI SE SIMPTOMI NAGLO JAVLJAJU I VEOMA JE VAŽNO NA VREME SPROVESTI HEMIJSKE MERE ZAŠTITE I ZAUSTAVITI DALJE ŠIRENJE BOLESTI.

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED JEČMA NA PRISUSTVO SIMPTOMA BOLESTI. UKOLIKO SE U FAZI ZASTAVIČARA REGISTRUJE 10% BILJAKA SA SIMPTOMIMA PEGAVOSTI PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
ZANTARA	TEBUKONAZOL + BIKSAFEN	1 - 1,25 L/HA
OSIRIS	EPOKSIKONAZOL + METKONAZOL	1,5 - 2,5 L/HA
ANTRE PLUS	TEBUKONAZOL + TIOFANAT-METIL	1,5 L/HA
DUETT ULTRA	EPOKSIKONAZOL + TIOFANAT-METIL	0,4 - 0,6 L/HA
PROSARO 250 EC	TEBUKONAZOL + PROTIOKONAZOL	0,75 - 1 L/HA
ASCRA XPRO	BIKSAFEN+FLUOPIRAM+PROTIOKONAZOL	0,9 – 1,2 L/HA
ELATUS ERA	BENZOVINDIPLUFIR+PROTIOKONAZOL	0,5 – 1 L/HA

VIZUELNIM PREGLEDIMA BILJAKA JEČMA REGISTROVANO JE I PRISUSTVO ODRASLIH JEDINKI, JAJA I TEK ISPIJENIH LARVI ŽITNE PIJAVICE. UKOLIKO SE PREGLEDOM UTVRDI PRISUSTVO OD 0,5 DO 1 LARVE ŽITNE PIJAVICE PO BILJCI, PREPORUČUJE SE PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE NEKIM OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
DECIS 2,5 EC, KONFUZIJA, FUTOCIS EC 2,5	DELTAMETRIN	0,2-0,3 L/HA
FASTAC 10 EC	ALFA-CIPERMETRIN	0,1-0,12 L/HA



SLIKA 5. LARVE ŽITNE PIJAVICE

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE
INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM