

## O STANJU U ZASADIMA KRUŠAKA

### FAZE KRUŠKE

NA PODRUČJU VOJVODINE KRUŠKE SE U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA. RANE SORTE POPUT JUNSKE LEPTICE SU U FAZI BERBE, A KASNIJE SORTE SU U FAZI RAZVOJA PLODOVA - PLODOVI SU DOSTIGLI 50 DO 70% KRAJNJE VELIČINE.



SLIKA1-FAZA RAZVOJA KRUŠKE

### OBIČNA KRUŠKINA BUVA (*Cacopsylla pyri*)

OBIČNA KRUŠKINA BUVA JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA KRUŠKE U INTENZIVNOJ PROIZVODNJI. U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA SEDAM GENERACIJA GODIŠNJE. ŠTETNI SU SVIH PET LARVENIH STADIJUMA, KOJI SE ISHRANJUJU SISAJUĆI SOKOVE BILJAKA. VIŠAK HRANE IZBACUJU U VIDU MEDNE ROSE, NA KOJU SE NASELJAVA GLJIVA ČAĐAVICA. NAPADNUTI BILJNI DELOVI DOBIJAJU CRNU BOJU, A PLODOVI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.

TRENUTNO SU U KRUŠICIMA, NA LASTARIMA SA VRŠNIM PORASTOM, PRISUTNI SVI RAZVOJNI STADIJUMI OVE ŠTETOČINE-ODRASLE JEDINKE, JAJA I LARVE. NAJDOMINANTNIJI STADIJUM SU JAJA.

**U TOKU JE POJAVA ODRASLIH JEDINKI I POČETAK POLAGANJA JAJA TREĆE LETNJE GENERACIJE OBIČNE KRUŠKINE BUVE.**

U NAREDNOM PERIODU OČEKUJE SE INTENZIVNO PILJENJE LARVI.



SLIKA 2. PARENJE IMAGA OBIČNE KRUŠKINE BUVE



SLIKA 3. JAJA OBIČNE KRUŠKINE BUVE NA NALIČJU LISTA

#### PREPORUKA

U KRUŠICIMA GDE JE U TOKU BERBA NE PREPORUČUJU SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE. U OSTALIM ZASADIMA NEOPHODNO JE SPROVESTI MERE ZAŠTITE PRIMENOM SLEDEĆE KOMBINACIJE INSEKTICIDA:

| INSEKTICID     | AKTIVNA MATERIJA  | DOZA/ KONCENTRACIJA |
|----------------|-------------------|---------------------|
| GROM           | LAMBDA-CIHALOTRIN | 0,5 L/HA            |
| +              | +                 | +                   |
| MOVENTO 100 SC | SPIROTETRAMAT     | 0,15%               |

UZ INSEKTICIDE PREPORUČUJE SE I PRIMENA OKVAŠIVAČA KOJI IMAJU ULOGU RAZLAGANJA MEDNE ROSE I POJAČANJA INSEKTICIDNOG DELOVANJA. MERE ZAŠTITE SPROVESTI U VEČERNJIM SATIMA.