

## Zelena prognoza za 22.7.2019. - O BRESKVINOM SMOTAVCU, VEOMA ZNAČAJNOJ ŠTETOČINI VOĆA NA NAŠEM PODRUČJU

### FENOFAZE BRESKVE

NA PODRUČJU VOJVODINE BERBA SREDNJESTASNIH SORATA BRESKVE I NEKTARINE JE U TOKU, DOK SE KASNE SORTE NALAZE U FAZI POČETKA OBOJAVANJA PLODA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA NEKTARINE, SORTA INDIPENDENS

### BRESKVIN SMOTAVAC (*Cydia molesta*)

BRESKVIN SMOTAVAC JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA U PROIZVODNJI VOĆA NA NAŠIM PROSTORIMA. NAJVEĆE ŠTETE PRIČINJAVA U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA, A MOŽE PROUZROKOVATI ŠTETE I NA ŠLJIVAMA, KAJSIJAMA, JABUKAMA, KRUŠKAMA I DUNJAMA.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U VRHOVE LASTARA ILI U PLODOVE.

NA MESTU GDE SE LARVA UBUŠI U PLOD MOŽE SE VIDETI SMOLOTOČINA KOJA CURI IZ PLODA I TAKVI PLODOVI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST I OTPADAJU PRE VREMENA.



SLIKA 2. UBUŠENJE NA PLODU NEKTARINE OD LARVE BRESKVINOG SMOTAVCA



SLIKA 3. LARVA BRESKVINOG SMOTAVCA I OŠTEĆENJE NA PLODU NEKTARINE

PORED OVIH DIREKTNIH ŠTETA USLED ISHRANE LARVI, VEOMA ZNAČAJNE SU I INDIREKTNE ŠTETE KOJE PROUZROKUJE BRESKVIN SMOTAVAC. PRISUSTVO OVE ŠTETOČINE U

PLODOVIMA VOĆA MOŽE DA OGRANIČI IZVOZ, JER JE BRESKVIN SMOTAVAC KARANTINSKA ŠTETOČINA U NEKIM ZEMLJAMA GDE SE IZVOZI NAŠE VOĆE.

U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA, BRESKVIN SMOTAVAC RAZVIJA ČETIRI GENERACIJE GODIŠNJE.

U TOKU JE POLAGANJE JAJA I PILJENJE LARVI TREĆE GENERACIJE BRESKVINOG SMOTAVCA.



SLIKA 4. JAJE BRESKVINOG SMOTAVCA PRED PILJENJE LARVE NA NALIČJU LISTA BRESKVE

#### PREPORUKA

PREPORUČUJE SE PROIZVOĐAČIMA BRESAKA I NEKTARINA KOD KOJIH SU ZASTUPLJENE KASNOSTASNE SORTE DA IZVRŠE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE KAKO BI SE SPREČILO UBUŠIVANJE LARVI BRESKVINOG SMOTAVCA U PLODOVE. SAMO U ZASADIMA KASNIH SORTI PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
CORAGEN 20 SC	Hlorantarniliprol	0,16 – 0,2 l/ha
DECIS 2,5 EC, POLUX, FUTOCIS EC 25	DELTAMETRIN	0,05%

S OBZIROM NA VISOKE DNEVNE TEMPERATURE, TRETMANE JE NAJBOLJE SPROVESTI U VEČERNJIM SATIMA, NA TEMPERATURA ISPOD 25 °C.

**PRILIKOM HEMIJSKE ZAŠTITE BRESAKA I NEKTARINA STROGO TREBA VODITI RAČUNA O KARENCI PRIMENJENIH PREPARATA S OBZIROM DA JE BERBA U TOKU.**

KARENCA JE VREME KOJE MORA DA PROTEKNE OD DANA PRIMENE INSEKTICIDA DO DANA BERBE PLODOVA. KARENCA ZA PREPORUČENI INSEKTICID IZNOSI 14 DANA.