

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“  
DANAS VAS INFORMIŠEMO O PREVENTIVNIM MERAMA U KONTROLI KROMPIROVOG MOLJCA

---

### FAZA RAZVOJA KROMPIRA

NA PODRUČJU VOJVODINE SETVA KROMPIRA ZA RANU PROIZVODNJU JE PRI KRAJU, A USKORO SE OČEKUJE I SETVA KROMPIRA NAMENJENOG ZA JESENJU PROIZVODNJU.



SLIKA 1. SETVA RANOG KROMPIRA

### **KROMPIROV MOLJAC (*Phthorimaea operculella*)**

KROMPIROV MOLJAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA KROMPIRA U JUŽNIM KRAJEVIMA NAŠE ZEMLJE, A OD PRE NEKOLIKO GODINA POSTAJE SVE ZNAČAJNIJI PROBLEM U PROIZVODNJI KROMPIRA I NA PODRUČJU VOJVODINE. U REGIONIMA VRŠCA, PANČEVA I NOVOG SADA

REGISTROVANE SU VELIKE BROJNOSTI KROMPIROVOG MOLJCA NA FEROMONSKIM KLOPKAMA I ŠTETE NA KRTOLAMA. U OSTALIM REGIONIMA POVEĆANJE BROJNOSTI I ŠTETA OD OVE ŠTETOČINE OČEKUJE SE U NAREDNIM GODINAMA.



SLIKA 2. ODRASLA JEDINKA KROMPIROVOG MOLJCA

PORED ŠTETA KOJE NANOSI USEVIMA U POLJU, U POVOLJNIM USLOVIMA U SKLADIŠTU, KROMPIROV MOLJAC NASTAVLJA SA RAZVOJEM, USLED ČEGA DOLAZI DO POVEĆANJA ŠTETA NA KRTOLAMA.

U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA NAJVEĆE ŠTETE KROMPIROV MOLJAC PRAVI NA KRTOLAMA. ŽENKE POLAŽU JAJA NA ZEMLJU OKO BILJAKA, STABLIJKU, NA I U OKCA NA KRTOLAMA. KADA SE ISPILE, LARVE SE UBUŠUJU U KRTOLU I KROZ NJIH PRAVE HODNIKE. OVAKO NAPADNUTE KRTOLE GUBE TRŽIŠNU VREDNOST, VEOMA BRZO PODLEŽU NAPADU DRUGIH PATOGENA I PROPADAJU.





SLIKA 3. LARVA KROMPIROVOG MOLJCA



SLIKA 4. ŠTETE OD ISHRANE LARVI NA KRTOLI KROMPIRA



SLIKA 5. ŠTETE OD ISHRANE LARVI NA KRTOLAMA KROMPIRA

### **PREPORUKA**

HEMIJSKE MERE ZAŠTITE U SUZBIJANJU KROMPIROVOG MOLJCA PREDSTAVLJAJU SAMO KOREKTIVNE MERE, A ZA USPEŠNU ZAŠTITU USEVA KROMPIRA OD OVE ŠTETOČINE VEOMA JE VAŽNA PRIMENA SVIH RASPOLOŽIVIH PREVENTIVNIH MERA KONTROLE.

PRE SADNJE KROMPIRA NAMENJENOG ZA JESENJU PROIZVODNJU, KOJI JE I NAJUGROŽENIJI OD KROMPIROVOG MOLJCA, PREPORUČUJU SE SLEDEĆE MERE KONTROLE:

- SETVA SORTI KROMPIRA KRAĆEG VEGETACIONOG PERIODA (RANE I SREDENJE RANE SORTE) JER SU NAJUGROŽENIJE SORTE SA DUGOM VEGETACIJOM
- KORIŠĆENJE ZDRAVIH I NEOŠTEĆENIH KRTOLA, PRILIKOM PREBIRANJA KROMPIRA TREBA IZBACITI SVE KRTOLE SA SIMPTOMIMA NAPADA OD KROMPIROVOG MOLJCA I DRUGIH ŠTETNIH ORGANIZAMA I UNIŠTITI IH
- DUBOKA SETVA (OPTIMALNA DUBINA SETVE 15 CM)
- FORMIRANJE VISOKIH BANKOVA

---

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)