

Zelena prognoza za 23.4.2018. - O stanju u zasadima vinove loze

FAZE VINOVE LOZE

NA PODRUČJU VOJVODINE, U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA I LOKALITETA, VINOVA LOZA SE NALAZI U FAZI OD TRI-ČETIRI RAZVIJENA LISTA DO FAZE CVAŠT NABUBRELA, CVETOV I ZATVORENI ZAJEDNO SPOJENI.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA VINOVE LOZE

CRNA PEGAVOST VINOVE LOZE (*Phomopsis viticola*)

CRNA PEGAVOST VINOVE LOZE JE BOLEST KOJA SE REDOVNO JAVLJA U NAŠIM VINOGORJIMA. SIMPTOMI PRISUSTVA OVE GLJIVE NAJJASNIJE SE UOČAVAJU U PROLEĆE. ZARAŽENI LASTARI SE PO BOJI KORE RAZLIKUJU OD ZDRAVIH, ONI SU SIVOBELI BOJE SA VELIKIM BROJEM CRNIH PIKNIDA-PLODONOSNIH TELA. LASTARI SU OŠTEĆENI U OSNOVI, DOLAZI DO NJIHOVOG PRSTENOVANJA I LOMLJENJA, CVAŠTI I GROZDOVI SE SUŠE. NAPADNUTA LOZA SLABIJE DOZREVA I LAKŠE IZMRZAVA U TOKU ZIME. U POČETKU RAZVOJA VINOVE LOZE I U VLAŽNIM USLOVIMA IZ PIKNIDA CURE SPORE KOJE VRŠE INFEKCIJU MLADOG ZELENOG TKIVA.



SLIKA 2. SIMPTOMI CRNE PEGAVOSTI VINOVE LOZE NA LASTARU

VIZUELNIM PREGLEDIMA ZASADA VINOVE LOZE REGISTRUJE SE DOMINANTNO PRISUSTVO NEAKTIVIRANIH PIKNIDA, A IZ KOJIH ĆE U USLOVIMA VLAŽENJA DOĆI DO OSLOBAĐANJA PIKNOSPORA.



SLIKA 3. PIKNIDI CRNE PEGAVOSTI NA KORI LASTARA

PEPELNICA VINOVE LOZE (*Uncinula necator*)

PEPELNICA VINOVE LOZE JAVLJA SE REDOVNO U NAŠIM VINOGRADARSKIM REGIJAMA. NAPADA SVE ZELJASTE DELOVE VINOVE LOZE, LIŠĆE, LASTARE, CVETOVE I GROZDOVE. U USLOVIMA POVOLJNIM ZA NJEN RAZVOJ MOŽE BITI VEOMA ŠTETNO OBOLJENJE I VODI KA SMANJENJU PRINOSA.

USLOVI KOJI TRENUTNO VLADAJU SU VEOMA POVOLJNI ZA RAZVOJ PEPELNICE.



SLIKA 4. PEPELNICA NA LISTU VINOVE LOZE

PREPORUKA

ZA SUZBIJANJE SIVE PEGAVOSTI I PEPELNICE VINOVE LOZE, PREPORUČUJE SE PRIMENA KOMBINACIJE NEKIH OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
KUMULUS DF, KOSSAN WG, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSE, WEBESAN +	SUMPOR	0,3-0,5%
MANKOGAL-80, BEVESAN 45 M	MANKOZEB	0,2-0,25%

TRETMAN IZVRŠITI PRE NAJAVLJENIH PADAVINA.