

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O AKTUELNIM MERAMA ZAŠTITE ZASADA BRESAKA I NEKTARINA OD ŠTETNIH ORGANIZAMA

.....

FAZE BRESAKA I NEKTARINA

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI BRESAKA I NEKTARINA SE NALAZE U FAZI POČETKA RAZVOJA PLODA.



SLIKA 1. ZASAD BRESKVE

TRENUTNO JE U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA AKTUELNA ZAŠTITA OD DVA VEOMA ZNAČAJNA PATOGENA U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA, A TO SU GLJIVE PROUZROKOVAČI PEPELNICE BRESKVE I ŠUPLJIKAVOSTI LISTA KOŠTIČAVOG VOĆA.

PEPELNICA BRESKVE (*Sphaerotheca pannosa* var. *persicae*)

PEPELNICA BRESKVE NAPADA SVE ZELJASTE DELOVE BRESKVE I NEKTARINE. NA ZARAŽENIM DELOVIMA DOLAZI DO FORMIRANJA BELIČASTE NAVLAKE KOJA PREDSTAVLJA REPRODUKTIVNE ORGANE GLJIVE. OVAJ PATOGEN SE NAJČEŠĆE JAVLJA NA MLADOM LIŠĆU KOJE SE USLED RAZVOJA GLJIVE UVIJA, A PRI JAČOJ ZARAZI SUŠI I OPADA. PLODOVI SU NAJUGROŽENIJI OD ZAMETANJA DO VELIČINE ORAHA. UKOLIKO DOĐE DO INFEKCIJE MLADIH

PLODOVA ONI SE SUŠE I OTPADAJU, A KOD KASNIJIH ZARAZA NA POKOŽICI PLODA DOLAZI DO FORMIRANJA BELIČASTIH I SIVKASTIH PEGA.



SLIKA 2. PEPELNICA NA LISTU BRESKVE



SLIKA 3. SIMPTOMI PEPELNICE NA PLODOVIMA NEKTARINE

ŠUPLJIKAVOST LIŠĆA KOŠTIČAVOG VOĆA (*Stigminta carpophila*)

GLJIVA, PROUZROKOVAČ ŠUPLJIKAVOSTI, NAPADA LIŠĆE, PLODOVE, LASTARE, PUPOLJKE I CVETOVE KOŠTIČAVOG VOĆA. NA ZARAŽENIM LISTOVIMA NAJPRE SE JAVLJAJU SITNE PEGE CRVENKASTO-SMEĐE ILI ŽUTE BOJE. VREMENOM SE PEGE POVEĆAVAJU, A TKIVO U OKVIRU PEGA NEKROTIRA I NASTAJU ŠUPLJINE, PO ČEMU JE OVAJ PATOGEN I DOBIO NAZIV. NA MLADARIMA USLED ZARAZE TAKOĐE DOLAZI DO FORMIRANJA PURPURNIH ILI MRKIH PEGA KOJE SE VREMENOM ŠIRE PRI ČEMU NASTAJU UZDUŽNE RAK RANE. DALJIM RAZVOJEM GLJIVE DOLAZI DO SUŠENJA MLADARA.



SLIKA 4. SIMPTOM ŠUPLIKAVOSTI NA LISTU BRESKVE



SLIKA 5. SIMPTOM ŠUPLIKAVOSTI NA LASTARU I PUPOLJICIMA BRESKVE

PREPORUKA

U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA, U CILJU SUZBIJANJA PROUZROKOVAČA BOLESTI, PRED PADAVINE KOJE SU NAJAVLJENE ZA KRAJ NEDELJE, PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆE KOMBINACIJE FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
AKORD	TEBUKONAZOL	0,075%
+	+	+
MERPAN 50-WP, CAPTAN 50 WP, METOD 480 SC	KAPTAN	0,2-0,3%

U POJEDINIM ZASADIMA SE REGISTRUJE PRISUSTVO ZELENE BRESKVINE VAŠI (*Myzus persicae*). PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED BRESAKA I NEKTARINA NA PRISUSTVO NAVEDENE ŠTETOČINE I UKOLIKO SE POTVRDI NJHOVO PRISUSTVO, PREPORUČUJE SE PRIMENA REGISTROVANIH INSEKTICIDA.



SLIKA 6. ZELENA BRESKVINA VAŠ

.....

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM