

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU
PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U USEVIMA LUBENICA

.....

FAZA RAZVOJA

NA PODRUČJU VOJVODINE, USEVI LUBENICE SE U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA I VREMENA
SETVE ODNOSNO SADNJE, NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA CVETANJA I RAZVOJA PLODA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA LUBENICE

VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA REGISTRUJE SE PRISUTVO SIMPTOMA ANTRAKNOZE LUBENICE I DINJE (*Colletotrichum lagenarium*), CRNE PEGAVOSTI LUBENICE (*Alternaria cucumerina*) KAO I PRISUSTVO LISNIH VAŠI (*Aphididae*).

ANTRAKNOZA LUBENICE I DINJE (*Colletotrichum lagenarium*)

ANTRAKNOZA LUBENICE I DINJE JE PATOGEN KOJI SE SVAKE GODINE JAVLJA U NAŠOJ PROIZVODNJI, A U GODINAMA KAO ŠTO JE OVA, U KOJIMA SE PROIZVODNJA ODVIJA U VLAŽNIM USLOVIMA, MOŽE U POTPUNOSTI UNIŠTITI PRINOS LUBENICE I DINJE.

OVAJ PATOGEN NAPADA SVE NADZEMNE ORGANE BILJKE. NA LISTOVIMA SIMPTOMI BOLESTI SE POJAVLJUJU U VIDU OKRUGLASTIH PEGA SIVKASTO-MRKE BOJE U OKVIRU KOJIH DOLAZI DO NEKROZE TKIVA. USLED JAČEG NAPADA DOLAZI DO POTUNOG SUŠENJA LISTOVA. NA VREŽAMA SE OBRAZUJU VEĆE ILI MANJE UZDUŽNE PEGE UTONULE U TKIVO IZNAD KOJIH DOLAZI DO SUŠENJA DELOVA VREŽE. NA PLODOVIMA SE OBRAZUJU MRKE PEGE U OKVIRU KOJIH JE TKIVO ULEGLO. KROZ OVE OTVORE DOLAZI DO PRODIRANJA PATOGENA PROUZROKOVAČA RAZLIČITIH VRSTA TRULEŽI, TE NAPADNUTI PLODOVI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.



SLIKA 2. SIMPTOM ANTRAKNOZE NA LISTU LUBENICE

GLJIVA KOJA PROUZROKUJE ANTRAKNOZU LUBENICE I DINJE PREZIMLJAVA U ŽETVENIM OSTACIMA I NA SEMENU U OBLIKU MILELIJE ILI KONIDIJA. POVOLJNI USLOVI ZA OSTVARENJE INFEKCIJA I ŠIRENJE OVOG PATIGENA JE KIŠNO I TOPLO VREME. OVAKVI USLOVI POGODUJU I RAZVOJU PROUZROKOVAČA CRNE PEGAVOSTI LUBENICE.



SLIKA 3. SIMPTOM ANTRAKNOZE NA VREŽI



SLIKA 4. SIMPTOM CRNE PEGVOSTI LUBENICE

PREPORUKA

S OBZIROM NA POVOLJNE USLOVE ZA RAZVOJ NAVEDENIH PATOGENA PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED USEVA I UKOLIKO SE REGISTRUJE PRISUSTVO SIMPTOMA PRIMENA REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
QUADRI TOP, TEATAR PLUS	AZOSKISTROBIN+DIFENOKONAZOL	1 L/HA

LISNE VAŠI (*Aphididae*)

VIZUELNIM PREGLEDOM USEVA LUBENICE REGISTROVANO JE PRISUSTVO LISNIH VAŠI. DIREKTNE ŠTETE NASTAJU KAO POSLEDICA NJIHOVE ISHRANE. USLED SISANJA BILJNIH SOKOVA DOLAZI DO DEFORMACIJE, ZAOSTAJANJA U PORASTU I SUŠENJA I PROPADANJA BILJNIH ORGANA. INDIREKTNE ŠTETE NASTAJU USLED LUČENJA MEDNE ROSE NA KOJU SE NASELJAVA GLJIVA ČAĐAVICA. PORED NAVEDENOG VAŠI SU I PRENOSIOCI VELIKOG BROJA BILJNIH VIRUSA.



SLIKA 5. SIMPTOM PRISUSTVA LISNIH VAŠI NA LISTU LUBENICE



SLIKA 6. SIMPTOM PRISUSTVA LISNIH VAŠI NA LISTOVIMA LUBENICE

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED USEVA I UKOLIKO SE REGISTRUJE PRISUSTVO VAŠI PRIMENA REGISTROVANOG INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
KOHINOR 200 SL	IMIDAKLOPRID	0,5-0,6 L/HA

U USEVIMA KOJI SU U FAZI CVETANJA PRIMENA INSEKTICIDA SE NE PREPORUČUJE. PRIMENU INSEKTICIDA TREBA SPROVODITI U VEČERNJIM ČASOVIMA KADA PČELE I DRUGI POLINATORI NISU PRISUTNI NA PARCELAMA I OKOLNOJ VEGETACIJI.

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM