

## Zelena prognoza za 23.7.2019. - O STANJU U ZASADIMA JABUKA I POTREBI SPROVOĐENJA MERA ZAŠTITE

### FAZE JABUKE

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI JABUKA SE NALAZE U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA, OD FAZE PLODOVI DOSTIGLI 70% KRAJNJE VELIČINE DO POČETKA SAZREVANJA PLODOVA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKE

### JABUKIN SMOTAVAC (*Carpocapsa pomonella*)

JABUKIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA JABUKE NA NAŠEM PODRUČJU.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U PLODOVE I ISHRANJUJU MESOM PLODA I SEMENKAMA. NAPADNUTI PLODOVI OTPADAJU PRE VREMENA I GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.



SLIKA 2. LARVA JABUKINOG SMOTAVCA



SLIKA 3. LARVA JABUKINOG SMOTAVCA U PLODU JABUKE

JABUKIN SMOTAVAC RAZVIJA TRI DO ČETIRI GENERACIJE TOKOM JEDNE GODINE, U ZAVISNOSTI OD USLOVA, PRE SVEGA TEMPERATURE.

U ZASADIMA JABUKA NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE PILJENJE LARVI DRUGE GENERACIJE JABUKINOG SMOTAVCA.

U VIZUELNIM PREGLEDIMA PLODOVA I LISTOVA JABUKA REGISTRUJE SE PRISUSTVO SVIH RAZVOJNIH STADIJUMA JAJA I TEK ISPILJENE LARVE OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 4. JAJE I TEK ISPILJENA LARVA JABUKINOG SMOTAVCA

#### PREPORUKA

U CILJU ZAŠTITE PLODOVA JABUKE OD UBUŠIVANJA LARVI JABUKINOG SMOTAVCA PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA.

U ZASADIMA GDE SU ZASTUPLJENE SORTE KOJE SE NEĆE BRATI U NAREDNIH MESEC DANA PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆEG INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
MOSPILAN 20 SG ILI ZLATOSPILAN ILI KESTREL ILI WIZZAARD	ACETAMIPRID	0,035%

U ZASADIMA GDE SU ZASTUPLJENE RANE SORTE POPUT GALE I GDE SE BERBA OČEKUJE OKO 10 AVGUSTA, PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA SA KRAĆOM KARENCOM:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
GROM, LAMDEX, ŠAKAL	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,02%

NAVEDENI INSEKTICIDI IMAJU KARENCU 14 DANA.