

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
VEČERAS VAS INFORMIŠEMO O REPIČINOM SJAJNIKU, VEOMA ZNAČAJNOJ ŠTETOČINI
ULJANE REPICE

FAZE ULJANE REPICE

NA PODRUČJU VOJVODINE, USEVI ULJANE REPICE SE NALAZE U FAZI OD RASTA STABLA DO FORMIRANI CVETNI PUPOLJCI JOŠ UVEK ZATVORENI LIŠĆEM.

REPIČIN SJAJNIK (*Meligethes aeneus*)

REPIČIN SJAJNIK JE JEDNA OD NAJZNAČAJNIJIH ŠTETOČINA ULJANE REPICE. JAVLJA SE SVAKE GODINE U SVIM REGIONIMA GDE SE GAJI ULJANA REPICA.

IMA JEDNU GENERACIJU GODIŠNJE I PREZIMI ODRASLA JEDINKA U ZEMLJI. RANO U PROLEĆE, KADA TEMPERATURE PREĐU 12°C IZLAZI IZ ZEMLJE I ODLAZI NA RAZNE KOROVE, PRVENSTVENO MASLAČAK. ČIM OTPOČNE FORMIRANJE PUPOLJAKA ULJANE REPICE PRELAZI NA NJU I ZAPOČINJE ISHRANU. INSEKTI BUŠE CVETNE PUPOLJKE I IZJEDAJU IH IZNUTRA DA BI DOŠLI DO POLENA KOJIM SE HRANE. OŠTEĆENI CVETNI PUPOLJCI SE VEĆINOM NE OTVARAJU, SUŠE SE I OTPADAJU. TAKOĐE, ŽENKE POLAŽU JAJA U PUPOLJKE I TO 1 DO 3 JAJETA U PUPOLJAK. LARVE SE HRANE POLENOM I DRUGIM DELOVIMA CVETA ŠTO POVEĆAVA ŠTETE NA ULJANOJ REPICI OD OVOG INSEKTA.

REPIČIN SJAJNIK JE NAJŠTETNIJI U PERIODU PRE OTVARANJA PUPOLJAKA. SA OTVARANJEM PUPOLJAKA UMANJUJE SE NJEGOVA ŠTETNOST JER MU JE OTVOREN PUT DO POLENA I NEMA POTREBU ZA IZGRIZANJEM PUPOLJAKA.



SLIKA 1. REPIČIN SJAJNIK NA CVASTI



SLIKA 2. REPIČIN SJAJNIK NA CVASTI



SLIKA 3. REPIČINI SJAJNICI NA CVASTI



SLIKA 4. IMAGO REPIČINOG SJAJNIKA IZGRIZA PUPOLJAK U POTRAZI ZA POLENOM

STANJE U USEVIMA ULJANE REPICE

VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA ULJANE REPICE SE REGISTRUJE PRISUSTVO IMAGA REPIČINOG SJAJNIKA. ZA SADA SU BROJNOSTI OVE ŠTETOČINE ISPOD PRAGA ŠTETNOSTI. TRENUTNI VREMENSKI USLOVI KOJI VLADAJU SU SMANJILI AKTIVNOST OVE ŠTETOČINE, ALI SE SA PODIZANJEM TEMPERATURA U NAREDNOM PERIODU OČEKUJE NASTAVAK AKTIVNOSTI. PROGNOZNO-IZVEŠTAJNA SLUŽBA ZAŠTITE BILJA AP VOJVODINE ĆE PRATITI STANJE U USEVIMA ULJANE REPICE I NA VREME ĆE OBAVESTITI PROIZVOĐAČE O PRIMENI HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE.

PRAG ŠTETNOSTI ZA REPIČINOG SJAJNIKA JE PRISUSTVO OD 0,8 DO 1 IMAGA REPIČINOG SJAJNIKA PO CVASTI ULJANE REPICE, U FAZI POČETKA FORMIRANJA CVETNIH PUPOLJAKA.

ZAŠTITA PČELA

PRILIKOM SPROVOĐENJA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE ULJANE REPICE OD REPIČINOG SJAJNIKA VEOMA JE VAŽNO PREDUZETI SVE MERE U CILJU ZAŠTITE PČELA I DRUGIH OPRAŠIVAČA.

PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE JE OPRAVDANA SAMO DO POČETKA CVETANJA. HEMIJSKE TRETMANE TREBA SPROVODITI U VEČERNJIM ČASOVIMA I OBAVEZNO TREBA OBAVESTITI PČELARE O PRIMENI INSEKTICIDA.

.....

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM