O STANJU U ZASADIMA VIŠANJA I TREŠANJA

.....

FAZE VIŠANJA I TREŠANJA

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI VIŠANJA I TREŠANJA SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA PLODOVA, OD FAZE POČETKA OBOJAVANJA PLODOVA DO PLODOVI ZRELI ZA BERBU.

SLIKA 1. FAZA RAZVOJA VIŠNJE

TREŠNJINA MUVA (*Rhagoletis cerasi*)

TREŠNJINA MUVA JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA U PROIZVODNJI TREŠANJA I VIŠANJA. ŠTETE NASTAJU SAMIM ČINOM OVIPOZICIJE ŽENKI KADA ZASECAJU POKOŽICU PLODA I UNUTAR NJEGA UBACUJU JAJA. NAJVEĆE ŠTETE NASTAJU OD ISHRANE LARVI, JER CRVLJIVI PLODOVI U POTPUNOSTI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.
NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE LET TREŠNJINE MUVE. NA FEROMONSKIM KLOPKAMA REGISTRUJU SE ULOVI ODRASLIH JEDINKI.

SLIKA 2. ODRASLE JEDINKE TREŠNJINE MUVE NA FEROMONSKOJ KLOPCI

PREPORUKA

U ZASADIMA VIŠANJA I TREŠANJA U CILJU SUZBIJANJA TREŠNJINE MUVE I SPREČAVANJA POLAGANJA JAJA U PLODOVE, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	**AKTIVNA MATERIJA**	**KONCENTRACIJA**
KESTREL, ZLATOSPILAN SP	ACETAMIPRID	0,025%
DECIS 2,5-EC, FUTOCIS EC-2,5, KONFUZIJA	DELTAMETRIN	0,07%
LAMDEX	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,05-0,07%

PRILIKOM PRIMENE INSEKTICIDA VODITI RAČUNA O KARENCI KOJA ZA NAVEDENE PREPARATE IZNOSI 14 DANA.

TRULEŽ PLODOVA KOŠTIČAVOG VOĆA (*Monilinia fructigena*)

OVAJ PATOGEN PREZIMLJAVA U ZARAŽENIM PLODOVIMA. U TOKU NAREDNE VEGETACIONE SEZONE, NA POVRŠINI ZARAŽENIH, MUMIFICIRANIH PLODOVA, DOLAZI DO FORMIRANJA SPORONOSNIH TELA GLJIVE. OVE SPORE SE OTKIDAJU SA POVRŠINE PROPALIH PLODOVA I NOŠENE VETROM I KIŠNIM KAPIMA OSTVARUJU NOVE INFEKCIJE. INFEKCIJE SE NAJINTENZIVNIJE OSTVARUJU PREKO POVREDA NA PLODU. PLODOVI KOŠTIČAVIH VRSTA VOĆA MOGU BITI INFICIRANI OD SAMOG ZAMETANJA PA DO BERBE, A PROCES DALJEG ŠIRENJA I PROPADANJA SE NASTAVLJA I U SKLADIŠNIM USLOVIMA.

TRENUTNI USLOVI SA PADAVINAMA SU VEOMA POVOLJNI ZA RAZVOJ PROUZROKOVAČA TRULEŽI PLODOVA KOŠTIČAVOG VOĆA. U OVOM PERIODU, NA POČETKU FAZE ZRENJA, ISPUNJAVAJU SE USLOVI ZA ZNAČAJNIJI RAZVOJ PATOGENA. POVEĆANI SADRŽAJ VODE I ŠEĆERA JE SREDINA U KOJOJ OVAJ PATOGEN POVEĆAVA I SVOJU AKTIVNOST.
NAKON OSTVARENE INFEKCIJE, NA POVRŠINI PLODOVA UOČAVAJU SE KONCENTRIČNI KRUGOVI, KOJI SE VEOMA BRZO ŠIRE I VEOMA BRZO OBUHVATAJU CEO PLOD.

PREPORUKA

U ZASADIMA VIŠANJA I TREŠANJA, ZA SUZBIJANJE TRULEŽI PLODOVA, PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG FUNGICIDA:

PREPARAT	**AKTIVNA MATERIJA**	**DOZA**
DIONAL 500 SC	IPRODION	1,5 L/HA

KARENCA ZA NAVEDENI PREPARAT IZNOSI 7 DANA.