

Zelena prognoza za 24.5.2019. - O STANJU U ZASADIMA ŠLJIVA

FENOFAZE ŠLJIVA

NA PODRUČJU VOJVODINE ŠLJIVE SE U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA NALAZE U FAZI OD PLODOVI DOSTIGLI OD 50 DO 70% KRAJNJE VELIČINE.




SLIKA 1. FAZA RAZVOJA ŠLJIVE

ŠLJIVIN SMOTAVAC (*Grapholita funebrana*)

ŠLJIVIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA ŠLJIVE KOJA U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA TRI GENERACIJE GODIŠNJE.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE HRANE MESOM PLODA. NAPADNUTI PLODOVI SE PREPOZNAJU PO SMOLOTOČINI KOJA CURI IZ NJIH, PO TAMNIM HODNICIMA U KOJIMA SE NALAZI GUSENIČNI IZMET I PO TOME ŠTO DOLAZI DO PREVREMENOG SAZREVANJA I OPADANJA PLODOVA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA ZASADA ŠLJIVA REGISTROVANA SU JAJA SVIH RAZVOJNIH STADIJUMA KAO I TEK ISPIJENE LARVE. U TOKU JE PERIOD INTENZIVNOG PILJENJA LARVI PRVE GENERCIJE OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 2. JAJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA NA PLODU



SLIKA 3. JAJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA PRED PILJENJE



SLIKA 4. ŠTETE OD LARVE ŠLJIVINOG SMOTAVCA NA PLODU

PREPORUKA

U CILJU ZAŠTITE PLODOVA ŠLJIVA OD UBUŠIVANJA LARVI ŠLJIVINOG SMOTAVCA PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
GROM	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,03%

ŠUPLJIKAVOST LIŠĆA KOŠTIČAVOG VOĆA (*Stigmia carpophila*)

GLJIVA, PROUZROKOVAČ ŠUPLJIKAVOSTI, NAPADA LIŠĆE, PLODOVE, LASTARE, PUPOLJKE I CVETOVE KOŠTIČAVOG VOĆA. NA LISTU, PEGE SU U POČETKU SITNE, CRVENKASTOSMEĐE ILI SIVOLJUBIČASTE, OVIČENE USKOM ZONOM SVETLOZELENE ILI ŽUTE BOJE. PEGE SE VREMENOM POVEĆAVAJU, TKIVO U OKVIRU PEGA NEKROTIRA I ISPADA, PA NA LISTU NASTAJU ŠUPLJINE. ZARAŽENO LIŠĆE OPADA PRE VREMENA.



SLIKA 5. SIMPTOM ŠUPLJIKAVOSTI LIŠĆA KOŠTIČAVOG VOĆA NA LISTU ŠLJIVE

VREMENSKI USLOVI KOJI SE TRENUTNO REGISTRUJU, ČESTE PADAVINE I VISOKA VLAŽNOST VAZDUHA, VEOMA SU POVOLJNI ZA RAZVOJ PROUZROKOVAČA ŠUPLJIKAVOSTI LIŠĆA KOŠTIČAVOG VOĆA.

PREPORUKA

U CILJU ZAŠTITE LISNE MASE PREPORUČUJE SE PRIMENA FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
MERPAN 50-WP, CAPTAN 50 WP, METOD 480 SC	KAPTAN	0,2 – 0,3%