

Zelena prognoza za 24.6.2019 - O STANJU U USEVIMA LUKA

FAZE LUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI PROLEĆNOG LUKA SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA LISTOVA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA PROLEĆNOG LUKA

DUVANOV TRIPS (*Thrips tabaci*)

U POSLEDNJIH DESET DANA NA PARCELAMA LUKA DOŠLO JE DO POVEĆANJA BROJNOSTI TRIPSA. TROPSKI DANI KOJI SU OBELEŽILI PRETHODNE DVE NEDELJE BILI SU IZUZETNO POVOLJNI ZA RAZVOJ OVIH ŠTETOČINA. NAROČITO SU UGROŽENA PODRUČJA GDE SE TRADICIONALNO GAJI LUK I GDE JE ZASTUPLJENA CELOGODIŠNJA PROIZVODNJA LUKA, I ZIMSKI I PROLEĆNI LUKOVI. NA TAKVIM PODRUČJIMA, NAKON VAĐENJA OZIMIH LUKOVA, DOŠLO JE DO MASOVNOG NASELJAVANJA TRIPSA NA USEVE PROLEĆNOG LUKA.



SLIKA 2. LARVE TRIPSA NA LISTU LUKA



SLIKA 3. LARVE TRIPSA NA LISTU LUKA

TRIPS JE JEDNA OD NAJZNAČAJNIJIH ŠTETOČINA LUKA. ŠTETE PRIČINJAVAJU I ODRASLI I LARVE SISAJUĆI SOKOVE BILJAKA. LUKOVI KOJI SU JAČE NAPADNUTI ZAOSTAJU U PORASTU I DOBIJAJU SREBRNKAST IZGLED.

MERE KONTROLE DUVANOVOG TRIPSA, PORED AGROTEHNIČKIH MERA KAO ŠTO SU PLODORED, NAVODNJAVANJE, DUBOKO ORANJE I ODGOVARAJUĆA ISHRANA, JESTE I PRIMENA INSEKTICIDA. SKRIVENI NAČIN ŽIVOTA OTEŽAVA POTPUNU EFIKASNOST INSEKTICIDA.

PREPORUKA

ZADOVOLJAVAJUĆI REZULTATI U SUZBIJANJU TRIPSA U LUKOVIMA POSTIŽU SAMO AKO NE DOĐE DO PRENAMNOŽENJA OVE ŠTETOČINE. ZATO JE SADA VEOMA VAŽNO PREGLEDATI LUKOVE I UKOLIKO SE UTVRDI PRISUSTVO 1 DO 2 LARVE PO LISTU LUKA, PREPORUČIJE SE PRIMENA SLEDEĆEG INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
EXIREL	CIJANTRANILIPROL	0,75 L/HA

PLAMENJAČA LUKA (*Peronospora destructor*)

U PROIZVODNJI OZIMIH LUKOVA, SREDINOM MAJA MESECA, REGISTROVANI SU PRVI SIMPTOMI PLAMENJAČE LUKA U OVOJ VEGETACIONOJ SEZONI.

PLAMENJAČA LUKA JE NAJZNAČAJNIJE OBOLJENJE U PROIZVODNJI LUKA NA NAŠEM PODRUČJU. ZA KRATKO VREME MOŽE DOĆI DO POTPUNOG PROPADANJA LISTOVA A ZARAZA SE ŠIRI I NA LUKOVICE ŠTO MOŽE PROUZROKOVATI DODATNE PROBLEME TOKOM SKLADIŠTENJA LUKA.

S OBZIROM NA PRISUSTVO INFEKTIVNOG MATERIJALA OVOG PATOGENA U POLJU I TRENUTNE USLOVE KOJI SU POVOLJNI ZA NJEGOV RAZVOJ, NEOPHODNO JE ZAŠTITITI PROLEĆNE USEVE LUKA I SPREČITI NASTANAK INFEKCIJE PROUZROKOVAČEM PLAMENJAČE.



SLIKA 4. SIMPTOMI PLAMENJAČE NA LUKU

PREPORUKA

U USEVIMA LUKA PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJ	DOZA
DAKOFLO	HLOROTALONIL	2-2,5 L/HA
BRAVO 720 SC		1,5-2 L/HA
ODEON		1,2-1,5 KG/HA