

O LETU I RAZVOJU BRESKVINOG SMOTAVCA NA PODRUČJU VOJVODINE

BRESKVIN SMOTAVAC (*Cydia molesta*)

BRESKVIN SMOTAVAC JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA U PROIZVODNJI VOĆA NA NAŠIM PROSTORIMA. NAJVEĆE ŠTETE PRIČINJAVA U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA, A MOŽE PROUZROKOVATI ŠTETE I NA ŠLJIVAMA, KAJSIJAMA, JABUKAMA, KRUŠKAMA I DUNJAMA.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U VRHOVE LASTARA ILI U PLODOVE. LARVE BRESKVINOG SMOTAVCA SE UBUŠUJU PRI VRHU SOČNIH, JOŠ NEZDRVENJENIH LASTARA. BUŠEĆI HODNIK KROZ SREDINU, LARVA SE KREĆE NIZ LASTAR A NA ULAZNI OTVOR IZBACUJE CRVOTOČINU. JEDNA LARVA MOŽE DA OŠTETI VIŠE LASTARA KOJI NAJPRE VENU, A POTOM ŽUTE I SUŠE SE.

LARVE SE UBUŠUJU I U UNUTRAŠNJOST PLODOVA. NA MESTU ULAZA MOŽE SE VIDETI SMOLOTOČINA KOJA CURI IZ PLODA I TAKVI PLODOVI OTPADAJU PRE VREMENA.



SLIKA 1. SIMPTOM OŠTEĆENJA OD LARVE BRESKVINOG SMOTAVCA NA LASTARU (SLIKA IZ PRETHODNE VEGETACIJE)



SLIKA 2. LARVA BRESKVINOG SMOTAVCA U LASTARU BRESKVE (SLIKA IZ PRETHODNE VEGETACIJE)



SLIKA 3. LARVA BRESKVINOG SMOTAVCA I OŠTEĆENJE OD NJENE ISHRANE NA PLODU BRESKVE (SLIKA IZ PRETHODNE VEGETACIJE)

PRISUSTVO OVE ŠTETOČINE U PLODOVIMA VOĆA MOŽE DA OGRANIČI IZVOZ, JER JE BRESKVIN SMOTAVAC KARANTINSKA ŠTETOČINA U NEKIM ZEMLJAMA GDE SE IZVOZI NAŠE VOĆE.

U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA BRESKVIN SMOTAVAC RAZVIJA TRI DO ČETIRI GENERACIJE GODIŠNJE, U ZAVISNOSTI OD REGIONA. PREZIMLJAVA U STADIJUMU POTPUNO ODRASLIH GUSENICA ZAPREDENIH U KOKONIMA NA STABLU ILI OKO NJEGA.

STANJE U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA

U OKVIRU SISTEMA PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE PRATI SE POJAVA I DINAMIKA LETA BRESKVINOG SMOTAVCA POMOĆU FEROMONSKIH KLOPKI. POČETAK LETA LEPTIRA PRVE GENERACIJE NA PODRUČJU VOJVODINE ZABELEŽEN JE KRAJEM MARTA I OD TADA SE BELEŽE KONTINUIRANI ULOVI ODRASLIH JEDINKI.

NA LOKALITETIMA KIKINDA, ČEREVIĆ, NEŠTIN, PANČEVO, HORGOS, ŠULJAM I PALIĆ U TOKU JE **RANI PERIOD POLAGANJA JAJA BRESKVINOG SMOTAVCA.**



SLIKA 4. IMAGO BRESKVINOG SMOTAVCA NA FEROMONSKOJ KLOPCI

PREPORUKA

PREPORUČUJE SE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA PREGLED ZASADA BRESAKA I NEKTARINA NA PRISUSTVO SVEŽE POLOŽENIH JAJA. SISTEM PROGNOZE PRATI POLAGANJE

JAJA I EMBRIONALNI RAZVOJ. PROIZVOĐAČI ĆE BITI OBAVEŠTENI O PRIBLIŽAVANJU MOMENTA PILJENJA LARVI I MERAMA KOJE JE NEOPHODNO PREDUZETI U CILJU NJIHOVOG SUZBIJANJA I SPREČAVANJA UBUŠENJA U LASTARE I PLODOVE.