

Zelena prognoza za 25.4.2018. - O stanju u zasadima jabuka

FENOFAZE JABUKA


NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI JABUKA SE NALAZE U FAZI OD PRECVETAVANJA DO FAZE POČETKA RAZVOJA PLODOVA.



SLIKA 1. - FAZA RAZVOJA JABUKA

ČAĐAVA PEGAVOST LISTA I KRSTAVOST PLODOVA JABUKE (*Venturia inaequalis*)

PERIOD PRIMARNIH INFEKCIJA OD PROUZROKOVAČA ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRSTAVOSTI PLODOVA JABUKE JE U TOKU. PROCES PRAŽNJENJA PSEUDOTECIJA ODNOSNO OSLOBAĐANJA ASKOSPORA I DALJE TRAJE TAKO DA SE U JABUČNJACIMA REGISTRUJE VISOK NIVO INFEKTIVNOG MATERIJALA OVOG PATOGENA. SA SVAKIM PADAVINAMA MOŽE SE OČEKIVATI OSLOBAĐANJE VELIKOG BROJA ASKOSPORA I VISOK RIZIK OD INFEKCIJA PROUZROKOVAČEM ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRSTAVOSTI PLODOVA JABUKE.



SLIKA 2. – ASKUSI SA ASKOSPORAMA

PREPORUKA

PRED NAJAVLJENE PADAVINE NEOPHODNO JE ZAŠTITI ZASADE JABUKA PRIMENOM PREVENTIVNIH PREPARATA:

| PREPARAT | AKTIVNA MATERIJA | DOZA/KONCENTRACIJA |
|--|------------------|--------------------|
| MANKOGAL 80, DITHANE M 45, MANKOGAL EKSTRA | MANKOZEB | 0,2 – 0,25 % |

PEPELNICA JABUKE (*Podosphaera leucotricha*)

U ZASADIMA JABUKA REGISTRUJE SE PRISUSTVO SIMPTOMA PEPELNICE. USLOVI U KOJIMA SE NALAZIMO SU VEOMA POVOLJNI ZA RAZVOJ OVOG PATOGENA.



SLIKA 3. SIMPTOM PEPELNICE JABUKE

PREPORUKA

U ZASADIMA SA OSETLJIVIM SORTAMA NA PEPELNICU JABUKE PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH FUNGICIDA:

| PREPARAT | AKTIVNA MATERIJA | DOZA/KONCENTRACIJA |
|--|------------------|--------------------|
| STROBY 50 SC, ARDENT 50 SC, ASENA, ROBY 50 WG, LUNAR | KRESOKSIM-METIL | 0,02 % |

JABUKINA ZELENA LISNA VAŠ (*Aphis pomi*)

VIZUELNIM PREGLEDIMA ZASADA JABUKA REGISTROVANO JE PRISUSTVO JABUKINE ZELENE LISNE VAŠI. VAŠI SE NALAZE NA LIŠĆU I VRHOVIMA MLADARA GDE SE HRANE ISISAVANJEM SOKOVA. USLED ISHRANE DOLAZI DO POVIJANJA LIŠĆA, A PRI JAČEM NAPADU I DO LUČENJA MEDNE ROSE NA KOJU SE POTOM NASELJAVA GLJIVA ČAĐAVICA.



SLIKA 4. JABUKINA ZELENA LISNA VAŠ



SLIKA 5. JABUKINA ZELENA LISNA VAŠ

PREPORUKA

U CILJU SUZBIJNJA VAŠI PREPORUČUJE SE PRIMENA REGISTROVANOG AFICIDA:

| PREPARAT | AKTIVNA MATERIJA | DOZA/KONCENTRACIJA |
|----------|------------------|--------------------|
| TEPPEKI | FLONIKAMID | 0,08 – 0,14 KG/HA |