

## Zelena prognoza za 25.6.2018. - O pegavosti lista šećerne repe

### FAZE ŠEĆERNE REPE

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI ŠEĆERNE REPE SE NALAZE U FAZI RAZVIĆA KORENA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA ŠEĆERNE REPE

### PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE (*Cercospora beticola*)

PROŠLE NEDELJE INFORMISALI SMO VAS O PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE I POTREBI SPROVOĐENJA PRVOG HEMIJSKOG TRETMANA U SUZBIJANJU OVOG PATOGENA. SVIM PROIZVOĐAČIMA KOJI DO SADA NISU SPROVELI MERE ZAŠTITE SKREĆEMO JOŠ JEDNOM PAŽNJU NA OVO VEOMA ZNAČAJNO OBOLJENJE REPE KOJE SE JAVLJA SVAKE GODINE NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU.

PEGE SE PRVO JAVLJAJU NA STARIJEM LIŠĆU U VIDU OKRUGLASTIH, SITNIH, SIVIH PEGA OVIČENIH MRKOM BOJOM. RAZVOJEM BOLESTI BROJ PEGA SE POVEĆAVA I DOLAZI DO

SUŠENJA DELOVA ILI CELOG LISTA. POSLE UGINUĆA VEĆEG BROJA LISTOVA DOLAZI DO RETROVEGETACIJE, ŠTO SE NEGATIVNO ODRAŽAVA NA PRINOS KORENA I SADRŽAJ ŠEĆERA.



SLIKA 2. PEGA NA LISTU ŠEĆERNE REPE



SLIKA 3. PEGA NA LISTU ŠEĆERNE REPE

POJAVA I ŠIRENJE PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE SU POD DIREKTNIM UTICAJEM TEMPERATURE I RELATIVNE VLAŽNOSTI VAZDUHA, PERIODA VLAŽENJA LISTA, OSETLJIVOSTI SORTE I UČESTALOSTI GAJENJA REPE NA JEDNOM REGIONU.

PRVI USLOVI KOJI SU OMOGUĆILI INFEKCIJU ŠEĆERNE REPE OD OVOG PATOGENA, NA VEĆINI PROIZVODNIH REGIONA OSTVARENI SU U PERIODU OKO 25. MAJA. PRISUSTVO PADAVINA U TOM PERIODU I POVOLJNE DNEVNE TEMPERATURE OKO 20°C OMOGUĆILE SU PRIMARNE INFEKCIJE.

U NAREDNOM PERIODU, U ZAVISNOSTI OD REGIONA, REGISTROVANO JE VIŠE POVOLJNIH USLOVA ZA RAZVOJ I ŠIRENJE PEGAVOSTI LISTA.

SVI OVI REGISTROVANI PARAMETRI POVOLJNIH USLOVA UKAZUJU DA SE RAZVIJA I REALIZUJE PARALELNO VIŠE CIKLUSA INFEKCIJE, ŠTO UTIČE NA SVAKODNEVNO PODIZANJE BROJA BILJAKA SA ISPOLJENIM PEGAMA.

## PREPORUKA

U TOKU PROŠLE NEDELJE NA VEĆINI PARCELA DOSTIGNUT JE PRVI EPIDEMIJSKI PRAG KOJI IZNOSI 50% BILJAKA SA MAKAR JEDNOM PEGOM. PROIZVOĐAČIMA KOJI DO SADA NISU SPROVELI HEMIJSKE MERE ZAŠTITE PREPORUČUJE SE PREGLED USEVA. UKOLIKO SE PREGLEDOM REGISTRUJE PROCENAT BILJAKA SA PEGAMA BLIZU ILI NA NIVOU EPIDEMIJSKOG PRAGA PREPORUČUJU SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE KOMBINACIJOM PREVENTIVNIH I SISTEMIČNIH FUNGICIDA:

PREPARATI	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
BRAVO 720 SC ILI DAKOFLO ILI BALEAR 720 SC	HLOROTALONIL	1,5 l/HA
+	+	+
RIAS 300-EC	DIFENOKONAZOL+PROPIKONAZOL	0,3 L/HA

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)