

## O RAZVOJU JABUKINOG SMOTAVCA NA PODRUČJU VOJVODINE

### FAZE JABUKE

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI JABUKA SE NALAZE, U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA, U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA PLODOVA. LETNJE SORTE SU U FAZI SAZREVANJA, A OSTALE SORTE SU U FAZI PLODOVI DOSTIGLI 70% KRAJNJE VELIČINE.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKE

### JABUKIN SMOTAVAC (*Carpocapsa pomonella*)

U ZASADIMA JABUKA NA PODRUČJU VOJVODINE PILJENJE LARVI DRUGE GENERACIJE JE NA KRAJU. NA VEĆINI PROIZVODNIH PODRUČJA ZAPOČEO JE LET TREĆE GENERACIJE I POLAGANJE JAJA. NA PODRUČJU NOVOG SADA, PANČEVA I IRIGA ZAPOČELO JE I PILJENJE LARVI TREĆE GENERACIJE OVE ŠTEOČINE.



SLIKA 2. JAJA JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODOVIMA JABUKE (SVEŽE POLOŽENO JAJE I JAJE PRED PILJENJE)



SLIKA 3. LARVA JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODU

#### **PREPORUKA**

NA REGIONIMA NOVI SAD, PANČEVO I RUMA GDE SE REGISTRUJE DO 10 % PILJENJA LARVI, NEOPHODNO JE ZAŠTITI PLODOVE JABUKA. S OBZIROM DA JE POLAGANJE JAJA NA NIVOU DO 20% NA OVIM REGIONIMA PRIMENITI OVICIDNO LARVICIDNI INSEKTICID U CILJU ZAŠTITE PLODOVA JABUKE OD UBUŠIVANJA LARVI JABUKINOG SMOTAVCA.

PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG INSEKTICIDA:

<b>PREPARAT</b>	<b>AKTIVNA MATERIJA</b>	<b>KONCENTRACIJA</b>
CORAGEN 20 SC	HLORANTRANILIPROL	0,02%

KARENCA ZA NAVEDENI PREPARATE IZNOSI 14 DANA. U ZASADIMA GDE JE U TOKU BERBA NE PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA.