

## O KUPUSNOM MOLJCU

---

### FAZE KUPUSA

KUPUSI KOJI SU NAMENJENI ZA JESENJU PROIZVODNJU NALAZE SE U FAZI POČETKA FORMIRANJA GLAVICE.



SLIKA 1 - FAZA KUPUSA

### **KUPUSNI MOLJAC (*Plutella maculipennis*)**

KUPUSNI MOLJAC JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA KUPUSNJAČA. POSLEDNJIH GODINA OVA ŠTETOČINA JE KAO I DRUGI MOLJCI U PROGRESIJI NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU. ŠTETE U PROIZVODNJI ČINE GUSENICE HRANEĆI SE LISTOVIMA, A PRI JAČEM NAPADU DOLAZI DO GOLOBRSTA KADA OSTAJU SAMO GLAVNI NERVI NA LISTOVIMA.

TOKOM JEDNE GODINE U NAŠIM USLOVIMA OVA ŠTETOČINA RAZVIJA SEDAM DO OSAM GENERACIJA. U POSLEDNJIH NEKOLIKO DANA NA FEROMONSKIM KLOPKAMA BELEŽE SE POVEĆANI ULOVI ODRASLIH JEDINKI. PRIBLIŽAVAMO SE MAKSIMUMU LETA LEPTIRA SEDME GENERACIJE.

VIZUELNIM PREGLEDIMA KUPUSNJAČA REGISTRUJE SE PRISUSTVO JAJA I GUSENICA NA NALIČJU LISTOVA. NA POJEDINIM PARCELAMA REGISTRUJE SE IZUZETNO JAK NAPAD OVE ŠTETOČINE GDE SU NA PREKO 60% BILJAKA REGISTRUVANE GUSENICE. U TOKU JE PILJENJE GUSENICA SEDME GENERACIJE KUPUSNOG MOLJCA.



SLIKA 2 - LARVA KUPUSNOG MOLJCA



SLIKA 3 - LARVA KUPUSNOG MOLJCA

### **PREPORUKA**

PROIZVOĐAČIMA KUPUSNJAČA PREPORUČUJE SE PREGLED BILJAKA NA PRISUSTVO GUSENICA KUPUSNOG MOLJCA. UKOLIKO SE REGISTRUJE NJIHOVO PRISUSTVO PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
DURBIN 200 EW	CIPERMETRIN	0,15-0,3 L/HA